



作物別	病蟲害種類	時期	防治要點
水稻	負泥蟲	全月	1.水稻生育初期，幼蟲發生時，施用3%加保扶粒劑，配合追肥混合後撒施。2.利用噴佈方式時可選用50%益滅松等推廣藥劑施用。3.施藥時慎防污染水源以免產生魚毒。
	葉稻熱病	中,下旬	1.適度氮、磷、鉀三要素配合施用，氮素肥料勿過量施用。2.插秧後25-30天左右，施用三賽唑可濕性粉劑或撲殺熱粒劑預防。3.病斑出現時，施用熱必斯、鋅錳乃浦、亞賜圃等藥劑防治。
	福壽螺	中,下旬	1.檢拾螺體、卵塊。2.進水口設置阻隔網。3.噴撒聚乙醛、耐克螺可濕性粉劑等藥劑，注意魚毒。
	螟蟲	下旬	稻株葉鞘變黃或田間有流葉、折葉、枯心時，即選擇撲滅松乳劑等藥劑施用。
玉米	煤紋病	中,下旬	1.力求肥料三要素平衡使用。2.發病初期施用錳乃浦可濕性粉劑防治。
	玉米螟	下旬	採用釋放寄生蜂，飼料玉米以加保扶粒劑等藥劑施用，食用玉米採用蘇力菌粒劑或可濕性粉劑。
落花生	小黃薊馬	下旬	發生初期以50%達馬松溶液防治。
雜糧作物	斜紋夜盜蟲 切根蟲	全月	1.播種整地時撒佈加保扶粒劑等防除。2.幼株時採用陶斯寧、大福松、陶斯松、畢芬寧乳劑等藥劑防除。3.栽種田區懸掛性費洛蒙緩釋劑(斜紋夜盜蟲)。
番茄	晚疫病	全月	1.注意氣象預報，連續雨天或停雨時，即噴施藥劑。2.藥劑選用氫氧化銅、亞托敏、鋅錳乃浦或亞磷酸施用。
芋	疫病	全月	1.注意氣象預報，連續雨天或停雨時，即噴施藥劑。2.選用鋅錳滅達樂、福賽得等藥劑噴施。