

# 蟲蟲危機

## 十二月主要作物病蟲害預測



徐保雄·林慶元

作物別	病蟲害種類	發生時期及程度	發生地區	防治要點
水稻	紋枯病	上中旬· 輕~中度 局部重度	各鄉鎮	1.注意田區排水。2.可選用保粒黴素或維利黴素等抗生素藥劑施用。
	白葉枯病	上中旬· 輕~中度 局部重度	各鄉鎮	1.選用10%克枯爛可濕性粉劑、10%鏈四環黴素可溶性粉劑，於發病初期施藥，每隔10天噴藥1次，共3次。2.注意：10%克枯爛可濕性粉劑單劑使用，以免發生藥害。3.晨露未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染。
	胡麻葉枯病	上中旬· 輕~中度	各鄉鎮	水稻齊穗後期至黃熟期，施用鋅錳乃浦水懸劑，錳乃浦水懸劑1-2次。
	縱捲葉蟲、 蛇木蝶	上中旬· 輕度	各鄉鎮	每平方公尺發現有1隻成蟲或在成蟲發生盛期後七天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達3葉(或每叢幼蟲1隻以上時)選用布芬第滅寧、毆殺松、陶斯松、賽扶寧、賽洛寧、亞速靈、大福賽寧等藥劑防除。
 稻褐飛蝨	上中旬·輕度	玉里、富里	每叢水稻平均5隻以上成蟲時即應施藥，其後再增加至20隻時行第二次施藥。2.防治時可選益達胺、布芬滅蝨、布芬淨等藥劑噴施。	
雜糧及芋	斜紋夜盜蟲	全月· 輕~中度	吉安鄉	1.設置性費洛蒙誘引站，誘殺雄蛾。2.幼蟲期配合施用芬化利、硫敵克、百滅寧、賽洛寧、畢芬寧、陶斯松、佈飛賽滅寧等藥劑。
蔬果瓜果	斜葉粉蝨	全月· 輕~重度	各鄉鎮	1.清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地、殘株及林木等以減少棲息場所2.參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑，並配合懸掛黃色粘板。
柑桔類	介殼蟲	全月·輕度	各鄉鎮	以44%滅松乳劑1000倍噴施防治。
青蔥	菌核病	全月·輕度	各鄉鎮	施用50%撲滅寧W.P.2000倍或50%大爛W.P.2000倍。
番茄	晚疫病	下旬·輕度	各鄉鎮	選用80%免得爛W.P.500倍或58%鋅錳滅樂W.P.400倍防治。