

蟲蟲危機

十一月份主要作物病蟲害預測



徐保雄·林慶元

作物別	病蟲害種類	發生時期及程度	發生地區	防 治 要 點
水 稻	紋枯病	上中旬· 輕~中度	各鄉鎮	1.注意田區排水。2.可選用保粒黴素或維利黴素等抗生素藥劑。
	白葉枯病	上中旬· 輕~中度 局部重度	各鄉鎮	1.選用克枯爛可濕性粉劑、鏈四環黴素可溶性粉劑，於發病初期施藥，每隔10天噴藥1次，共3次。2.克枯爛可濕性粉劑應單劑使用，以免發生藥害。3.晨露未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染。
	胡麻葉枯病	上中旬· 輕~中度	各鄉鎮	水稻齊穗後期至黃熟期，施用鋅錳乃浦水懸劑、錳乃浦水懸劑 1 至 2 次。
	縱捲葉蟲 蛇木蝶	上中旬· 輕度	各鄉鎮	每平方公尺發現有 1 隻成蟲或在成蟲發生盛期後七天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達 3 葉(或每叢幼蟲 1 隻以上時)選用布芬第滅寧、毆殺松、陶斯松、賽扶寧、賽洛寧、亞速靈、大福賽寧等藥劑防除。
	稻褐飛虱	上中旬·輕度	玉里、富里	1.每叢水稻平均 5 隻以上成蟲時即應施藥，其後再增至 20 隻時行第二次施藥。2.防治時可選益達胺、布芬滅蟲、布芬淨等藥劑噴施。
雜糧及芋	斜紋夜盜蟲	全月· 輕~中度	吉安鄉	1.設置性費洛蒙誘引站，誘殺雄蛾。2.幼蟲期配合施用芬化利、硫敵克、百滅寧、賽洛寧、畢芬寧、陶斯松、佈飛賽 滅寧等藥劑。
蔬菜瓜果 庭園花木	銀葉粉虱	全月· 輕~重度	各鄉鎮	1.清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地殘株及林木等以減少棲息場所。2.參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑，並配合懸掛黃色粘板。
玉 米	螟 蟲	全月·輕度	各鄉鎮	1.採用寄生蜂及配合選用加保扶、大福松、陶斯松等粒劑防除(雄花抽穗前) 2.無釋放寄生蜂區可用蘇力菌、依芬寧等藥劑噴施。
青 蔥	甜菜夜蛾 蔥潛蠅	全月· 輕~中度	各鄉鎮	施用 19.7% 得芬諾水懸劑 2000 倍或以 75% 賽滅淨可濕性粉劑 5000 倍防治。
	菌核病	全月·輕	各鄉鎮	選用 50% 大克爛 2000 倍、50% 撲滅靈可濕性粉劑 2000 倍或 50% 免克靈水分散性粒劑 1000 倍。

