

蟲蟲危機

十月份主要作物病蟲害預測



徐保雄·林慶元

作物別	病蟲害種類	發生時期及程度	發生地區	防治要點
水稻	紋枯病	中下旬· 輕~中度	各鄉鎮	1.稻株出現病斑時施用有機砷劑或福多寧可濕性粉劑等藥劑1次，隔2週再施藥1次。2.有機砷劑易發生藥害，須注意施用(抽穗前10天停止施用)。3.孕穗、抽穗可選用保粒黴素或維利黴素等劑施用。
	白葉枯病	上中旬· 輕~中度	各鄉鎮	1.選用克枯爛可濕性粉劑、鏈四環黴素可溶性粉劑，於發病初期施藥，每隔10天噴藥1次，共3次。2.避免偏用氮肥。晨露未乾前勿進入稻田，減少人為傳染。
	胡麻葉枯病	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.孕穗期及齊穗期施用鋅錳乃浦水懸劑，錳乃浦水懸劑，普克利乳劑各一次。2.抽穗前缺氮時酌施穗肥。
	縱捲葉蟲	全月· 中、局部重度	各鄉鎮	每平方公尺發現有1隻成蟲或在成蟲發生盛期後七天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達3葉(或每叢幼蟲1隻以上時)選用毆殺松，布芬第滅寧、陶斯松、賽扶寧、賽洛寧、亞速靈、大福賽寧等藥劑防除。
	螟蟲	全月·輕度	各鄉鎮	1.螟蛾出現後5-7天(尤應注意抽穗前期)，選撲滅松、芬殺松、益滅松等藥劑防治。2.施用藥量每公頃至少1,000-1,200公升稀釋量。
	褐飛蝨	全月· 輕~中度	玉里、富里	每叢水稻平均5隻以上成蟲時即應施藥，其後再增加至20隻時行第二次施藥。防治時可選益達胺、布芬滅蝨、布芬淨等藥劑噴施。
雜糧及芋	斜紋夜盜蟲	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.設置性費洛蒙誘殺雄蛾。2.幼蟲期配合施用芬化利或硫敵克、百滅寧、賽洛寧、畢芬寧、陶斯松、佈飛賽、百滅寧等藥劑。
蔬菜瓜果	銀葉粉蝨	全月·輕度	各鄉鎮	1.清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地殘株及林木等以減少棲息場所。2.選用畢芬寧、阿巴汀、益達安等藥劑，並懸掛黃色粘板。
青蔥	甜菜夜蛾 蔥潛蠅	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.施用19.7%得芬諾水懸劑2000倍。 2.施用75%賽滅淨可濕性粉劑5000倍。
	蔥薊馬	全月·輕	各鄉鎮	選用50%培丹水溶性粉劑1000倍。

