

# 公告修正及新增農藥使用方法

農藥名稱	公告事項			
0.05%第滅寧片劑 2%亞特松粉劑	公告刪除「0.05%第滅寧片劑」及「2%亞特松粉劑」在倉庫積穀害蟲之使用方法範圍。			
20%免扶克乳劑	「20%免扶克乳劑」使用於甘藍小菜蛾及蚜蟲之注意事項內容刪除「本藥劑僅限甘藍使用，禁止使用於小菜菜類」並修正安全採收期為「採收前 12 天停止用藥」。			
農藥名稱	使用方法		使用範圍	注意事項
	每公頃每次用藥量	稀釋倍數		
85%克蠅香混合溶液	每公頃懸掛誘殺器 10-20 個，每個誘蟲 燈用藥 5 公撮。	原液	瓜蠅(雄成蟲)	1.瓜類生育及開花結果期均可使用，每隔 2 週換藥 1 次 2.與 58%乃力松乳劑或 50%芬殺松乳劑之比例為 10 : 1。
95%克蠅溶液		原液	胡瓜瓜實蠅	1.本藥劑為引誘劑，應混合農藥於瓜類生育及開花結果期使用，每隔 7 天補充藥液，以棉球沾濕置於塑膠誘殺器中。 2.與 58%乃力松乳劑或 50%芬殺松乳劑之比例為 10 : 1。 3.每公頃懸掛誘殺器 10-20 個，每個用調配藥液 5 公撮。
43%佈飛松乳劑	1-1.2 公升	1,000	薤菜小金花蟲	新增加使用範圍
2.8%賽洛寧乳劑	1-1.2 公升	1,000	薤菜小金花蟲	新增加使用範圍
50%免速達可濕性粉劑	1-1.2 公升	1,000	薤菜小金花蟲	新增加使用範圍
10.3%蘇力菌水分散性粒劑	0.3-0.5 公斤	4,000	蓮花斜紋夜盜蟲	新增加使用範圍
23%泰隆乳劑	0.5 公升	2,000	萵苣葉斑病	新增加使用範圍
21.2%依滅列乳劑	0.8 公升	1,500	萵苣葉斑病	新增加使用範圍
9.6%益達胺溶液	0.8-1.2 公升	1,500	蓮花小黃薊馬	新增加使用範圍
9.6%益達胺溶液	0.8-1.2 公升	1,500	蓮花斜紋夜盜蟲	新增加使用範圍