

蟲蟲危機

九月份主要作物病蟲害預測



徐保雄·林慶元

作物別	病蟲害種類	發生時期及程度	發生地區	防治要點
水稻 	紋枯病	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.分蘗盛期如發病，施用有機砒劑或50%福多寧可濕性粉劑等，隔二週再施藥一次。2.有機砒劑易發生藥害，須注意施藥。3.孕穗、抽穗期可選用保粒黴素或維利黴素等抗生素劑施用。
	螟蟲	全月·輕度	各鄉鎮	1.螟蛾出現後7-10天或有葉鞘變黃達10%時，應即施藥防除。2.藥劑選用撲滅松、芬殺松、益滅松、培丹等推廣藥劑防治。
	白葉枯病	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.幼穗形成期前施用6%撲殺熱粒劑或於發病初期施用10%克枯爛可濕性粉劑、10%鏈四環黴素可溶性粉劑等。2.避免偏用氮肥。晨露未乾前勿進入稻田，減少人為傳染。
	縱捲葉蟲 稻苞蟲	中下旬· 輕~中度	各鄉鎮	每平方公尺發現有一隻成蟲或在成蟲發生盛期後七天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達三葉(或每叢幼蟲一隻以上時)選用毆殺松，布芬第滅寧、大福賽寧等藥劑防除。
柑橘	銹蟎、銹蟬	全月·輕	各鄉鎮	施用20%畢達本可濕性粉劑3000倍
蔬菜瓜果	銀葉粉蝨	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.清除園區附近雜草、休耕地及林木等以減少棲息場所。2.選用畢芬寧、阿巴丁、益達安等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。
青蔥	甜菜夜蛾 蔥潛蠅	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.施用19.7%得芬諾水懸劑2000倍。 2.施用75%賽滅淨可濕性粉劑5000倍。
	蔥薊馬	全月·輕	各鄉鎮	選用50%培丹水溶性粉劑1000倍。

