

# 蟲蟲危機

## 花蓮縣七月份主要作物病蟲害預測



徐保雄

作物別	病蟲害種類	發生地區	防治要點
水稻	黑尾浮塵子	各鄉鎮	水田收割後應即翻犁稻田，深埋殘株，並清除田邊雜草；於秧苗期或本田初期施用加保扶粒劑防治。
	螟蟲	各鄉鎮	水田收割後儘速翻犁，深埋殘株以減少寄主場所；育苗期施用3%加保扶粒劑，成蟲出現後5-7天以50%撲滅松乳劑防治。
蔬菜瓜果	銀葉粉蝨	各鄉鎮	清除園區附近雜草、林木等以減少棲息場所；參考選用畢芬寧、阿巴丁、益達安等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。
落花生 玉米	夜盜蟲類	各鄉鎮	採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲；播種整地時施撒3%加保扶粒劑或10%福瑞松粒劑；發芽後參考採用2.8%賽洛寧乳劑噴施於根際部，田園四周同時施藥。
芋	斜紋夜盜蟲	吉安等地	採用性費洛蒙緩釋劑誘殺雄性成蟲；初齡幼蟲出現時，於傍晚噴施畢芬寧或陶斯松等藥劑，田埂、溝壁亦應同時施藥。
	疫病	吉安等地	發病初期以鋅錳滅達樂等藥劑噴施。

