

蟲害危機

宜蘭縣三月份主要作物病蟲害預測

林慶元

作物別	病蟲害種類	發生地區	防治要點
蔥、蒜	黑斑病	三星、宜蘭市、壯圍、員山、五結	發現黑斑病初期病斑即刻施用 50%依普同W.P. 1,000倍或23%亞托敏水懸劑3,000倍防治之
蔥、韭	銹病	宜蘭市、壯圍、員山、三星、五結	發現銹病初期病徵時施用23%三泰隆E.C. 2,000倍
水稻	負泥蟲	全縣	發現初期施用3%加保扶粉劑40~60公斤/公頃、50%益滅松可濕性粉劑1,000倍、40.6%加保扶水懸粉800倍，任選一種防治之。
番茄	晚疫病	礁溪、五結、員山、羅東	發現初期施用83%氫氧化銅可濕性粉劑400倍、50%達滅芬可濕性粉劑400倍、64%鋅錳歐殺斯可濕性粉劑500倍、鋅錳滅達樂可濕性粉劑400倍，任選一種防治之。
瓜類	露菌病	五結、員山、壯圍、三星、宜蘭市	發現初期施用23%亞托敏水懸劑2,000倍、39%硫酸快得寧可濕性粉劑400倍、39.5%普拔克溶液400倍，任選一種防治之。

