

# 蟲蟲危機

## 花蓮二月份主要作物病蟲害預測

文 徐保雄

作物別	病蟲害種類	發生地區	防治要點
水	苗徒長病	各鄉鎮	<ol style="list-style-type: none"><li>1.徹底實施稻種消毒，稻種浸種前先予浸水4小時後再以25%撲克拉乳劑2,000倍液消毒24小時，消毒期間隨時攪動藥液以提高藥效。</li><li>2.苗期發現病株時，隨時拔除不可移植本田。</li></ol>
	秧苗期寒害	各鄉鎮	<ol style="list-style-type: none"><li>1.育苗場(圃)選擇避風或設置防寒(風)牆(網)。</li><li>2.寒流來臨時，利用PE塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清掃布上積水，以防低溫凍傷。寒流離境後將塑膠布掀開。</li><li>3.畦溝保持流水狀態。</li></ol>
	插秧期至成活期寒害	各鄉鎮	<ol style="list-style-type: none"><li>1.避免在寒流過境時期之插秧作業，俟寒流離境後再進行插秧。</li><li>2.已插秧之田區，田間灌溉水位宜較深(水深不得淹沒秧苗)保護秧苗，俟氣溫回升後則恢復淺水位之灌溉。</li><li>3.受寒害嚴重田區及早補植，以免生育參差不齊。一般田區則酌施追肥促進恢復生長，增加耐(抗)寒力。</li></ol>
稻	負泥蟲	近山區稻田	幼株期負泥蟲幼蟲出現時可施用3%加保扶粒劑(配合施用追肥與肥料混合後撒施)、5%撲滅松乳劑。
芋	斜紋夜盜蟲	吉安	<ol style="list-style-type: none"><li>1.芋田區懸掛性費洛蒙緩釋劑。</li><li>2.幼蟲初發生時噴施2.8%畢芬寧乳劑、蘇力菌。</li></ol>
韭菜	疫病	吉安	多雨、露水時間長時易發生。病斑初現時噴施58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑、80%福賽得可濕性粉劑。
	銹病	吉安	發病初期以5%菲克利水懸劑、50%賜加落可濕性粉劑噴施。

