

蟲蟲危機

花蓮區九十年一月份主要作物病蟲害發生預測

文／林慶元、陳任芳

作物別	病害種類	發生地區	防治要點
青蔥	紫班病 (中、下旬·輕度)	吉安、三星、宜蘭市、壯圍、員山、五結	發病初期施用50%依普同可濕性粉劑100倍或44.2%克收欣水溶劑2500倍或45%甲鋅保粒素可濕性粉劑500倍。
韭菜	潛蠅 (全月·輕度)	吉安、員山、三星	發現初期被害時用75%賽滅淨可濕性粉劑5000倍或50%益滅松可濕性粉劑1000倍
梨樹	梨瘤蚜 (全月·輕度)	三星、冬山、員山	<ol style="list-style-type: none"> 1. 嫁接前：全區用80%硫磺水分散性粉劑400倍澈底噴藥一次，以減少枝幹上病源。接穗用80%硫磺水分散性粉劑400倍浸二分鐘或用45℃溫水浸30分鐘以殺滅接穗上之蟲卵。 2. 嫁接後：以凡士林等膠物，指寬環狀塗抹嫁接處下方，以防止枝幹上若蟲向果實部分遷移危害。 3. 接嫁後套袋前：施用50%加護滅必蟲可濕性粉劑1000倍或48.34%丁基加保扶乳劑1200倍防治之。
十字花科	黃條葉蚤 (全月·輕度)	吉安、五結、員山壯圍、三星、宜蘭市	50%培丹可溶性粉劑1000倍、43%佈飛松乳劑1000倍或2%阿巴汀乳劑1000倍。
番茄	晚疫病 (全月·輕度)	吉安、富里	發病初期施用23%亞托敏水懸劑1000倍或50%達滅芬可濕性粉劑4000倍

