

近期白葉枯病、白尖病為害請農友注意施藥防治

徐保雄

九月中、下旬花蓮地區氣候因受東北季風及鋒面影響，時有降雨與強風吹襲，各鄉鎮水稻均有白葉枯病為害，尤其以玉里、富里水稻栽培區最為明顯，農友可任選下列一種藥劑施藥防治，施藥時應注意克枯爛可濕性粉劑宜單劑使用，以免發生藥害。

10%克枯爛可濕性粉劑每公頃1.2公斤1,000倍，每10天施藥一次連續三次。

10%鏈四環素可濕性粉劑每公頃1公斤1,000倍，每10天施藥一次連續三次。

此外，在玉里、富里水稻田區白尖病亦普遍發生，發病初期稻葉尖呈油浸狀淡黃色，再漸轉為灰白色而呈線條狀捲曲，長度約1-5公分不等，健全組織與罹病組織間呈現明顯之暗綠色似波狀的橫隔紋，將影響稻穀稔實，降低品質產量。農友可在田間稻株葉尖出現捲枯現象時參考下列藥劑一種施用，並於抽穗開花完畢齊穗後噴施，以避免藥害發生。

50%撲滅松乳劑每公頃1.2公斤1,000倍液。

22.5%陶斯松乳劑每公頃1.6公升750倍液。

2.9%賽扶寧乳劑每公頃1.0公升1,500倍液。