

# 蟲蟲危機

## 花蓮、宜蘭縣十一月份主要作物病蟲害預測

文 徐保雄、林慶元

作物別	病害種類	發生地區	防治要點
水稻	白葉枯病 (上、中旬·輕-中度)	宜蘭、花蓮 各鄉鎮	發病初期為葉緣呈黃色條斑，條斑之周緣呈波浪狀，初期發生可選用10%克枯爛可濕性粉劑或10%鏈四環黴素可溶性粉劑，每隔10天噴藥一次，共三次。
	胡麻葉枯病 (上、中旬·輕-中度)	花蓮各鄉鎮 (晚植稻)	水稻齊穗後至黃熟期，施用33%鋅錳乃浦水懸劑、37%錳乃浦水懸劑1-2次。
蔬菜、瓜果、庭園花木	銀葉粉蝨 (全月·輕-重度)	花蓮各鄉鎮	1.清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地殘株及林木等減少棲息場所。 2.參考選用畢芬寧、阿巴丁、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。
青蔥	甜菜夜蛾 (全月·輕度)	三星、宜蘭市 壯圍、員山、五結	發現蔥葉有該蟲為害時，即施用19.7%得芬諾水懸劑2000倍或2.15%因滅汀E.C.1500倍或4.4%祿芬隆E.C.1500倍。
柑桔	介殼蟲·粉蝨 (全月·輕度)	頭城、礁溪、員山 三星、冬山、蘇澳	發生時施用50%馬拉松E.C.800倍或44%大滅松E.C.1000倍。
韭菜	疫病 (全月·輕度)	員山、三星	發生初期噴施84.2%三得芬E.C.2000倍或5%菲克利水懸劑1500倍或30%三得寧E.C.1000倍防治之。

