

# 蟲蟲危機

## 花蓮、宜蘭縣十月份主要作物病蟲害預測

文 徐保雄、林慶元

作物別	發生病蟲害及有害動物	發生地區	防治要點
水稻	白葉枯病	各鄉鎮	選用10%克枯爛可濕性粉劑、10%鏈四環黴素可溶性粉劑，於發病初期施藥，每隔10天噴藥一次，共三次。
	縱捲葉蟲	各鄉鎮	每平方公尺發現有一隻成蟲或在成蟲發生盛期後七天，幼蟲捲葉數每叢稻平均達三葉(或每叢幼蟲一隻以上時)選用毆殺松、布芬第滅寧、陶斯松、賽扶寧、賽洛寧、亞速靈、大福賽寧等藥劑防除。
	胡麻葉枯病	各鄉鎮	孕穗期及齊穗期施用33%鋅錳乃浦水懸劑，37%錳乃浦水懸劑，25%普克利乳劑各一次。抽穗前缺氮時酌施穗肥。
雜糧及蔬菜(芋)作物	斜紋夜盜蟲	花蓮縣吉安鄉(芋) 各鄉鎮	設置性費洛蒙誘引站，誘殺雄蛾。 幼蟲期配合施用芬化利或硫敵克、百滅寧、賽洛寧、畢芬寧、陶斯松、佈飛賽、百滅寧等藥劑。
蔬菜、瓜果、庭園植物	銀葉粉虱	各鄉鎮	清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地殘株及林木等減少棲息場所。 參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。
青蔥	甜菜夜蛾	三星、宜蘭市、壯圍、員山、五結	發現蔥葉有該蟲為害時，即施用19.7%得芬諾水懸劑2000倍或2.15%因滅汀E.C.1500倍或4.4%祿芬隆E.C.1500倍。
銀柳	炭疽病	三星	發生初期施用15%福多寧E.C.1500倍或24.9%待克利E.C.3000倍。
柑桔	葉蟎	頭城、礁溪、員山、三星、冬山、蘇澳	葉蟎密度每葉達5隻時施藥，25%新殺蟎E.C.500倍或20%西脫蟎E.C.1500倍或55%殺蟎多E.C.2000倍。
	粉虱		發生初期施50%馬拉松E.C.800倍或44%大滅松E.C.1000倍。

