

蟲蟲危機

花蓮縣九月份 主要作物病蟲害預測

文 徐保雄

作物別	發生病蟲害 及有害動物	發 生 地 區	防 治 要 點
水 稻	紋 枯 病	各 鄉 鎮 (中、下旬·輕-中度)	<ol style="list-style-type: none">1. 分蘖盛期如發病時，施用有機砒劑或50%福多寧可濕性粉劑等推廣藥劑一次，隔14天再施藥一次。2. 有機砒劑，易發生藥害，須注意施藥量、濃度及施藥時間。3. 孕穗、抽穗可選用保粒黴素或維利黴素等抗生素劑施用。
	白葉枯病	富里、玉里為主要地區， 其他鄉鎮為次要區。 (全月·輕-中度)	<ol style="list-style-type: none">1. 幼穗形成期前施用6%撲殺熱粒劑或於發病初期施用10%克枯爛可濕性粉劑、10%鏈四環黴素可溶性粉劑等。2. 避免偏用氮肥。晨露未乾前，勿進入稻田，減少人為傳染。
芋	斜紋夜盜蟲	吉 安 (全月·輕-中度)	<ol style="list-style-type: none">1. 幼蟲出現時即選用陶斯松、百滅寧、畢芬寧、賽洛寧等藥劑防治。2. 設置性費蒙誘殺站，誘殺雄蛾。
蔬菜、 瓜 果	銀葉粉蝨	新城、秀林、花蓮市、 吉安(其他地區亦請注意) (全月·輕-中度)	<ol style="list-style-type: none">1. 清除園區附近雜草、休耕地、廢耕地殘株及林木等減少棲息場所。2. 參考選用畢芬寧、阿巴丁等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。
蓮 花	小黃薊馬	光復、吉安、花蓮市 (全月·輕-中度)	<ol style="list-style-type: none">1. 清除栽培田區殘株、周邊什草等。2. 噴施益達胺、亞滅培等參考藥劑。配合懸掛藍色粘板。