水生蔬菜開發之研究

報告人：蔬菜研究室 黃稚甄

一、計畫主持人：林文華

二、計畫期程：98 年 9 月 14 日至 99 年 4 月 30 日

三、工作內容：

（一）水合歡料理製作及食譜資料建立。

（二）夏秋季水生食用植物食譜資料建立與整理。

（三）紅柄水蓮菜栽培密度試驗調查。

（四）協助毛過長沙矮化劑成果調查及離水試驗調查。

（五）協助水合歡栽培密度試驗調查。

（六）協助不同深度種植之大葉象耳生長情形結果調查。

四、工作成果：

（一）水合歡料理製作：

委請印尼等外籍人士，利用水合歡爲主食材製作出 20 道料理。並將蒐集所得之食材名稱、材料、作法及照片彙整編排爲食譜初稿。

（二）夏秋季水生食用植物食譜資料建立與整理：

與勝洋水草餐廳合作，利用 10 種水生食用植物，研發出 24 種夏秋季水生食用植物之料理。並將蒐集所得之食材名稱、材料、作法及照片彙整編排爲食譜初稿。

（三）紅柄水蓮菜栽培密度試驗調查

試驗分爲四種處理：綠柄水蓮菜 20x20 cm，紅柄水蓮菜 15x20 cm、20x20cm、25x20 cm。每穴種植 2 支插穗。調查各單位面積（1 m^2）之產量、莖數等。結果顯示綠柄水蓮菜產量最差，紅柄水蓮菜產量較高，但 3 處理間無顯著性差異。種植期間遭遇莫拉克颱風，使生長受阻，進而影響試驗結果。綠柄水蓮菜生育較差，主因扦插初期即遇淹水，致使恢復生長明顯受阻。

（四）毛過長沙矮化劑成果調查試驗調查

試驗分爲 14 種處理：其中以 T-6、T-8、T-9、T-11 及 T-12 等五種株高控制組有較佳的外觀。

（五）水合歡栽培密度試驗調查

分爲四種不同栽培密度處理，以密植-3 處理之產量最高，全年總採收量、50 cm 長嫩莖及 30 cm 長嫩莖之年採收量均達到慣行栽培密度的 5 倍以上。

（六）不同深度種植之大葉象耳生長情形結果調查

試驗分爲 5 種處理：不湛水、水深 3-5、10、20、30 cm。調查葉長、葉面積及每株葉數等，初步以不湛水與水深 3-5 cm 表現較佳。

水生蔬菜開發之研究

報告人：黃稚甄
計畫主持人：林文華 先生
工作時期：98年9月~99年4月
工作地點：蘭陽分場蔬菜研究室

2010.04.06

工作內容

1. 水合歡料理製作及食譜資料建立
2. 夏秋季水生食用植物料理製作聯繫及食譜資料整理
3. 紅柄水蓮菜栽培密度試驗調查
4. 其他協助試驗調查工作項目

1. 水合歡料理製作及食譜資料建立

- 完成20道水合歡料理之製作方式蒐集整理及初步編排

2. 夏秋季水生食用植物料理製作聯繫及食譜資料整理

- 完成24道夏秋季水生食用植物料理之製作連繫、食譜資料整理及初步編排。

種類及料理數量

空心菜	7道
水紫蘇	5道
龍骨瓣苦菜 (水蓮)	4道
水合歡	2道
大葉田香	1道
蓮藕	1道
蓮梗	1道
水芹	1道
水薄荷	1道
蕹菜	1道

合計10種 24道


3.紅柄水蘿菜栽培密度試驗調查
處理
綠柄水蘿菜 20×20 cm
紅柄水蘿菜 15×20 cm
紅柄水蘿菜 20×20 cm
紅柄水蘿菜 25×20 cm


種植時間：98年6月
種植地點：分場試驗田區
種植方式：兩節插穗 2支/穴 直接扦插
調查項目：單位面積產量(m²)

結果
紅柄水蘿菜栽培密度試驗調查
處理(株距cm) 長度(cm) 總重(g) 莖數
綠柄(20) 67.9 b 1857.8 b 32.5 b
紅柄(15) 181.6 a 7101.0 a 141.7 a
紅柄(20) 176.8 a 6064.3 a 124.5 a
紅柄(25) 167.8 a 5207.3 a 114.3 a

討論
因遭遇莫拉克颱風，使生長受阻，影響試驗調查結果，否則產量應更高。
綠柄水蘿菜生育較差，主因為種植初期即遇淹水，致使恢復生長明顯受阻。