

胡瓜及花胡瓜病蟲害防治

83/03/10 花蓮區農情資訊 8

台灣省農林廳為獎勵農民正確使用農藥，以保護農作物並避免農產品農藥殘留超過行政院衛生署公告容許量，特設計“吉園圃” - 安全用藥標章，本（八十三）年度“吉園圃”優良農業操作花蓮縣選定壽豐鄉花胡瓜產銷第三班、第八班及鳳林鎮花胡瓜產銷第二班進行輔導。

為減少防治胡瓜及花胡瓜病蟲害的農藥殘留，花蓮區農業改良場推薦數種較不易殘留之藥劑，請種植胡瓜、花胡瓜的農友參考選用，並請務必確實遵守各藥劑之使用方法。

1. 薊馬：

(1)43%佈飛松乳劑 800 倍（克蟲能、吉利龍、速力龍）

(2)50%免敵克可濕性粉劑 1,500 倍（嘉福賜）

(3)50%二氯松乳劑 1,500 倍

- ． 一 速
- ． 保必安
- ． 倍安松
- ． 利 必
- ． 威 靈
- ． 得利偉必
- ． 萬靈殺
- ． 速克丹
- ． 速必丹
- ． 速必靈

2. 瓜蠅：

95%克蠅溶液（久留旺）

3. 炭疽病、細菌性斑點病：

40%銅快得寧混合可濕性粉劑 500 倍（新萬果生、菌殺多）

4. 白粉病：

(1)25%依瑞莫水懸劑 1,500 倍

- ． 白克靈
- ． 白粉水仙
- ． 黴克靈
- ． 黴可淨
- ． 黴 絕

(2)10%得滅多乳劑 1,500 倍（滴滅丹）

- (3)25%布瑞莫乳劑 3,000 倍 (克粉靈)
- (4)11.76%芬瑞莫乳劑 10,000 倍 (穩達達)
- (5)5%菲克利水懸劑 2,000 倍 (安滅樂)
- (6)12%邁克尼乳劑 4,000 倍
- 13.4%乳劑 (成果)
- 40%可濕性粉劑 (信生)

5.露菌病：

- (1)50%益地安可濕性粉劑 500 倍 (露菌靈)
- (2)55%晴硫昆銅可濕性粉劑 500 倍 (保果丹銅、大果丹銅、果丹 - K)
- (3)39%硫酸快得寧可濕性粉劑 400 倍 (靈滅樂)
- (4)58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑 400 倍 (全滅露 - 鋅錳、利露滅 - 鋅錳、露速淨)
- (5)77.5%嘉賜銅可濕性粉劑 1,000 倍 (加瑞農、治寧、露菌滅) (作物環境課陳哲民)