

胡 椒 科

小巧圓融的椒草

— 前言

椒草廣泛自生於台灣全島低海拔地區森林中，近似圓形的葉片上有著細細密密的絨毛，手指不經意的拂過表面時觸感柔軟、綿密而舒服，看上去有如一片片圓圓厚厚的翠綠絨球搖曳在眼前，鮮活的景象令人感受到溫馨而開朗的生命力。椒草原本是生長在陰暗而潮濕的濃密樹林下，大部分是附生在林下的岩石上或樹洞中，生長於土壤中的屬於少數，因為生育環境比較陰暗潮濕，所以自然狀態下看到的椒草，葉片上時常附著了苔蘚植物或藻類，時間久了以後還會黏上一些飄落的塵垢，因此，看起來總是稀疏徒長而污穢，並不醒目；然而經過細心專注的栽培管理後，馬上搖身一變成爲「小而美」的觀葉盆栽，觀賞價值因而大大的提高，頗受參觀者好評，目前已有部分業者量產小型盆栽行銷，分享給愛好花卉園藝的民眾，可擺設於居家或辦公室的窗檯、茶几、書桌上，是室內綠美化盆栽的最佳拍檔。



椒草之細長花序



椒草附生於石上之自然狀態

二 植物性狀及園藝利用

台灣原生的椒草在植物學之分類上則屬於胡椒科（Piperaceae）椒草屬之多年生叢生性肉質草本，學名為 *Peperomia japonica* Makino，陸生或附生草本，莖叢生，匍匐或直立，密生毛，肉質；葉3~6片輪生，無托葉，全緣，常有透明腺體，橢圓至長橢圓形，長1~7cm，寬0.8~4.5cm，先端鈍至圓，基部鈍至尖銳，兩面密生毛，上表面為翠綠色至深綠色，下表面則為淺綠色，3或5出脈；花序穗狀，有柄，與葉對生，花小，兩性，無花被，由一小苞片包被；雄蕊、心皮合生；花期於冬季至春季；核果具黏性。

椒草在園藝觀賞利用上，針對植株分枝眾多且叢生性高、葉片輪生緊密、葉形整齊平展、葉色明亮翠綠及細長的穗狀花序等清新脫俗的外觀特性，培育成為小品的觀葉盆栽，無論是擺設在室內的書桌、茶几或窗台上，都是居家及辦公環境綠美化的新選擇。



三 繁殖方法及栽培管理

繁殖方法：椒草之繁殖方法主要有扦插法及播種法。扦插法的插穗採2~4節帶葉為宜，成活率高達100%，凡保水力及排水性均良好之無土介質、河砂、壤土或粘質壤土均可，扦插後需隨時保持扦插介質之濕潤，插穗大約在扦插後2週後即已發根，4~5週後之扦插苗則可定植於盆鉢。自扦插至成盆約需3~4個月的時間。

水份管理：椒草之水份供應需要適當充足，尤其要注意栽培介質須具備良好的排水及通氣性，否則，盆栽太濕加上高溫易導致根群腐爛，可在盆栽下方放置一個水盤，每次澆水直到盆底有水滲出時就可停止，並於稍後將滲漏於水盤中多餘的水倒掉，即可輕鬆愉快照顧好您的心愛盆栽了。

日照管理：椒草適合做為小型盆栽觀賞，性喜涼爽陰暗，應盡量避免擺設於陽光長時間直接照射的地點，栽培期間以50%之遮蔭處理或放置於陰涼處，所培養的椒草葉片比較翠綠，觀賞品質較佳，觀賞壽命也比較長。

肥料管理：椒草盆栽之營養補給以緩效性粒狀肥料較為方便操作，施用輕肥即可（約2.5~3.0公克/5吋盆），並定期依據各種緩效性肥料之有效期限追加補充。

雜草及病蟲害管理：椒草盆栽之雜草不多，一般均以人工拔除為主要防除手段。夏天椒草易發生根莖腐爛之病害，需注意水分及溫度的控制，其他病蟲害則不多見。



椒草細小且具黏性之核果

盆栽管理：椒草盆栽為增加其分枝數，須進行2~3次之摘心處理，以增加叢生性，並隨時將局部雜亂衰弱的枝條去除，亦可進行整株大修剪使植栽能迅速恢復其觀賞性，修剪後之盆栽宜適量施加追肥。

四 現況與展望

台灣原生的椒草屬植物除了椒草外，其他尚有小椒草（*P. reflexa*）、紅莖椒草（*P. sui*）、蘭嶼椒草（*P. rubrivenosa*）與山椒草（*P. nakaharai*）等種類，亦同樣具有觀賞價值，值得開發利用，椒草屬植物除了園藝觀賞利用外還具有保健之用途，常見於藥草專書上的有椒草（猴耳）及小椒草。



園藝栽培的椒草葉片明亮翠綠



椒草的中、小型觀賞盆栽



椒草的扦插苗

