

## 農友信箱

徐保雄 2000-12 花蓮區農業專訊 34:23

問：1.非洲菊植株葉片下垂，莖基部呈現水浸狀而縊縮、組織褐化，萎凋枯死，是何原因？如何防治？(玉山神學院．壽豐鄉池南村)

答：1.經實物檢診係感染疫病。

2.防治方法：發病初期以 5%滅達樂粒劑，每株施用 0.5 公克於地際部位。

問：2.甜椒果實初期有褐色斑點，後期病斑向下凹陷並有許多褐色小點，品質低劣無商品價值。是何原因？如何防治？(丁舒漢．壽豐鄉水璉村)

答：1.經實物檢診係感染炭疽病。

2.防治方法：發病初期以 22.7%晴硫琨水懸劑，每公頃每次用 1.0-1.5 公升，稀釋 700 倍，每 10 天一次共 3 次。採收前 4 天停止施藥。

問：3.小胡瓜葉片上呈現黃褐色多角形病斑，嚴重時斑點相癒合，使下葉向上枯死，是何原因？如何防治？(陳秋香．吉安鄉慶豐村)

答：1.經實物檢診係感染露菌病。

2.防治方法：發病初期即以 23%亞托敏水懸劑，每公頃每次用 0.5 公升，稀釋 2,000 倍或 58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑，每公頃每次用 2.0-2.5 公升稀釋 400 倍，每七天施藥一次，連續 3-4 次。應注意安全採收期。

問：4.蘇鐵植株莖頂之嫩芽枯萎，羽狀小葉殘缺，影響外觀，是何原因？如何防治？(空軍單位．吉安鄉)

答：1.經實物及現場診斷係受小灰蝶為害。

2.防治方法(參考)：初發生時以 40.8%陶斯松乳劑 1,000 倍液或 44%大滅松乳劑 1,000 倍噴施於心葉部，每隔 7-10 天一次，共 2 次。

問：5.黑板樹嫩葉及心芽受害捲折，重者乾枯脫落，是何原因？如何防治？(古建邦．縣政府農業局，花東縱谷風景區管理處)

答：1.經實物檢診係受捲葉蛾為害。

2.防治方法(參考)：初現葉片捲折現象時即以 2.8%畢芬寧乳劑 2,000 倍液或 40.8%陶斯松乳劑 1,000 倍噴施，每 7-10 天一次，共 2 次。

問：6.茄冬樹葉背部位出現無數斑點，致葉色變黃、脫落，是何原因？如何防治？(古建邦．縣政府農業局)

答：1.經實物檢診係受葉蟬及薊馬為害。

2.防治方法(參考)：發生初期即以 9.6%益達胺溶液 1,500 倍或 20.0%亞滅培可溶性粉劑 2,000 倍噴施，每 7 天一次，共 2-3 次。

問：7.山蘇葉片被蟲啃食成鋸齒缺刻狀，影響商品價值，是何原因？如何防治？(陳敏男．宜蘭縣南澳鄉)

答：1.經由郵寄樣品檢診係受毒蛾幼蟲為害。

2.防治方法(參考)：(1)生長期，以 22.5%陶斯松乳劑 1,000 倍或 2.8%畢芬寧乳劑 1,000 倍噴施一次。(2)採收期，以蘇力菌 1,000 倍噴施 2 次，間隔 5 天。

問：8.番石榴幼果有灰褐色隆起斑點，木栓化粗糙並易脫落，影響成長。是何原因？如何防治？(黃紹奎．吉安鄉慶豐村)

答：1.經實物檢診係感染瘡痂病。

2.防治方法(參考)：於發生初期噴施 75%四氯異苯 可濕性粉劑 700 倍液，每 7-10 天一次，共 2-3 次。應注意安全採收期。