

農友信箱

徐保雄 2000-06 花蓮區農業專訊 32:28

問 1.文旦柚幼果皮部先呈枯朽色澤，後轉變成黑，是何原因？如何防治。(林俊達．瑞穗鄉鶴岡村)

答：1.經實物診斷係受銹蟬成蟲及若蟲以口器刺破表皮細胞吸取汁液危害後之現象。

2.防治方法：於銹蟬密度每葉達 5 隻時，以 5%普芬 水懸劑 1,000 倍液，每一公頃每次用 2.0 公升噴施一次。或以 50%新殺福化乳劑 2,000 倍液每一公頃每次用 1.0 公升噴施，於初發生時施藥一次。

問 2.桑葉捲縮脫落，或有白色粉狀物，帶有蜜露，是何原因？如何防治。(黃文宏．吉安鄉北昌村)

答：1.經實物診斷係受桑木蝨若蟲棲息葉背部刺吸汁液後之危害現象。

2.防治方法：

(1)加強桑園雜草及通風管理。

(2)害蟲初現時及以 37%繁米松溶液 2,000 倍，每一公頃每次用 0.5-0.6 公升或 50%芬殺松乳劑 2,000 倍液，每一公頃每次用 0.4-0.8 公升噴施葉背部位一次。施藥後 5 天方可採葉。

問 3.番石榴果實有粗糙疤痕、生育不良，葉片上亦有蟲之分泌之排泄物，是何原因？如何防治。(黃紹奎．吉安鄉慶豐村)

答：1.經實物檢診係受薊馬為害後之現象。

2.防治方法：蟲害發生時，以 2.8%賽洛寧乳劑 1,000 倍液，每一公頃每次用 1.5-2.0 公升或 3 %亞滅寧乳劑 1,000 倍液，每一公頃每次用 1.5-2.0 公升噴施一次。採收前 6 天停止用藥。

問 4.甜椒心芽或花芽幼嫩組織有蟲體，致呈皺縮畸形，或葉焦枯脫落，是何原因？如何防治。(吳阿勝．玉里鎮中城里)

答：1.經實物檢診係受細蹣為害。

2.防治方法：於蟲害初發生時，以 25%新殺 乳劑 500 倍液，每一公頃每次用 1.5-2.0 公升，每 7-10 天噴施一次。採收前 15 天停止施藥。

問 5.葉用甘藷葉片有蟲體嚙食，形成不規則線痕，是何原因？如何防治。(吳錦財．吉安鄉福興村)

答：1.經實物檢診係受潛葉蛾為害。

2.防治方法：生長期中有五分之一葉片受害時，及以 50%撲滅松乳劑 1,000 倍液，每一公頃每次用 1.0 公升或 90%納乃得可濕性粉劑 1,800 倍液，每一公頃每次用 0.5 公升噴施 1-2 次。注意安全採收期。

問 6.水稻葉片上有暗綠色紡錘形斑點，呈枯萎狀，是何原因？如何防治。(劉天德．吉安鄉南華村，許國祥．吉安鄉宜昌村)

答：1.經實物檢診係感染葉稻熱病。

2.防治方法：初發生時及以 20%嘉賜三賽唑可濕性粉劑 1,500 倍液，每一公頃每次用 0.65 公斤或 54%保米熱必斯可濕性粉劑 1,500 倍液，每一公頃每次用 0.6 公斤，每 7-10 天噴施一次，共 2 次。

問 7.番茄園噴施除草劑(嘉磷塞)後植株心葉不伸長，黃化現象，是何原因？如何預防。(楊建添．吉安鄉永興村)

答：1.經實地園區及樣品檢診係因噴施嘉磷塞除草劑後的藥害現象。

2.番茄園區應以 17.5%伏寄圃乳劑，每一公頃用 1.0-1.5 公升稀釋至 600 公升液，均勻噴施於雜草上。

問 8.豇豆葉片上呈白色小點，生育不良是原因？如何防治。(闕榮良．吉安鄉福興村)

答：1.經實物檢診係受葉蟎為害。

2.防治方法：於初發生時以 2.8%賽洛寧乳劑 2,000 倍，每一公頃每次用 0.5-1.0 公升或 24.9%待克利乳劑 3,000 倍液，每一公頃每次用 0.3-0.5 公升，每 7-10 天噴施一次。注意安全採收期。