

## 農友信箱

徐保雄、楊大吉 1999-06 花蓮區農業專訊 28:23

一、甜椒果實初期產生褐色斑點，後逐漸擴大並向下凹陷生成黑色小點，是何症狀？（許鎮榮，瑞穗鄉）

答：1.經田間實物診斷係感染炭疽病。

2.防治方法：發病初期以 22.7%晴硫琨水懸劑 700 倍噴施，每 10 天一次共三次。可酌加展著劑以增強藥劑效果。採收前 4 天停止用藥。

二、榕樹枝條附著有臘質狀物，致使葉片枯死脫落並呈煤污狀，如何防治？（國福國民小學）

答：1.經實物檢查診斷係受膠蟲為害之現象。

2.防治方法：

(1)以 44%大滅松乳劑 1,000 倍或 50%撲滅松乳劑 1,000 倍噴施。

(2)施藥防治前先將折枯枝及嚴重被害枝剪除燒燬。

三、蔥葉上呈現小型褐斑，後擴大為紡錘形，邊緣紅紫色，是何種病害？如何防治？（葉義雄·吉安鄉）

答：1.經實物診斷係感染紫斑病。

2.防治方法（參考）：

發病初期以 50%依普同可濕性粉劑 1,000 倍或 45%甲鋅保粒素可濕性粉劑 500 倍噴施，每隔 7~10 天一次。應注意安全採收期。

四、睡蓮葉片上產生褐色圓形斑點，並著生白絹狀菌絲，嚴重部位腐爛並有似菜子之物，應如何防治？（陳明通·吉安鄉）

答：1.經實物診斷係感染白絹病。

2.防治方法（參考）：

發病初期以 50%福多寧可濕性粉劑 3,000 倍或 75%滅普寧可濕性粉劑 1,000 倍，每 10 天噴施一次共五次。應注意安全採收期。

五、小仙丹枝葉幼嫩部位有蟲啃嚼造成缺刻或枝枯，應如何防治？（黃金旺·吉安鄉）

答：1.經實地現場診斷係受黃毒蛾為害。

2.防治方法（參考）：以 2.8%畢芬寧乳劑 1,000 倍，每七天噴施一次共二次。

六、韭菜葉片表皮會突起縱裂，並露出黃色粉狀物，應如何防治？（洪豐坤·吉安鄉）

答：1.經現場實物診斷係感染銹病。

2.防治方法：

(1)發病初期以 5%菲克利水懸劑 1,500 倍或 50%賜加落可濕性粉劑 1,500 倍，每 7~10 天噴施一次。

(2)應注意安全採收期，不得施用於韭黃及韭菜花。

七、辣椒自莖部分枝處有白色黴狀物，使植株呈萎凋狀後褐化枯死，應如何防治？（閩達卿·壽豐鄉）

答：1.經實物檢診係感染菌核病。

2.防治方法：本病冬季發生較多，應於定植後約 60~70 天以 50%撲滅寧可濕性粉劑 2,000 倍噴施近地際部。採採收前 3 天停止噴藥。