

## 農友信箱

### 陳朝欽、徐保雄 1998-12 花蓮區農業專訊 26:23

一、芋株心葉不伸、黃化，頭部腐臭，不知何病？如何防治。（林有賜·吉安鄉）

答：經實物診斷係感染芋軟腐病。

防治方法：

- 1.種苗消毒（種植前）：以 35% 依得利可濕性粉劑稀釋 1,500 倍浸漬 10 分鐘，陰乾後種植。
- 2.或定植後等田區以 5% 滅達樂粒劑每公頃 20 公斤撒佈，保持淺水狀態 3 天。

二、葡萄柚葉片上有水浸暗綠斑點，應如何防治？（吳進興·瑞穗鄉）

答：依實物症狀診斷係感染潰瘍病。

防治方法：於發生初期以 65% 鎳乃浦稀釋 400 倍每 15 天噴施一次，或 81.3% 嘉賜銅可濕性粉劑 1,000 倍，每三週一次（視風雨侵襲及發病情形酌加次數）。

三、檸檬苗株近地際部潰爛，小枝尾梢褐枯、凋萎，不知何原因？（謝德金·壽豐鄉）

答：經實物及實地檢診係感染疫病。

防治方法（參考）：以 35% 依得利可濕性粉劑稀釋 2,500 倍或 58% 鋅錳滅達樂可濕性粉劑稀釋 400 倍，灌注苗株地際部份。

四、菜豆葉片背面有黑褐色斑，表面淡黃色，不知何原因？如何防治。（陳秀吉·鳳林鎮）

答：經檢視實物葉片係感染銹病。

防治方法：可採用 30% 三得寧乳劑稀釋 1,000 倍於發病初期施用，隔 10 天再施用一次。  
注意安全採收期。

五、番茄葉部呈水浸狀轉深褐枯萎，不知病原？如何防治。（高正塘·壽豐鄉）

答：經實物診斷係感染疫病。

防治方法：

- 1.發病初期以 70% 甲基鋅乃浦可濕性粉劑稀釋 500 倍或 80% 免得爛可濕性粉劑 500 倍實施，每 5~7 天一次。
- 2.注意安全採收期。

六、橡皮樹葉片正反面有黴狀物，生育不良，如何防治？（林次郎·吉安鄉）

答：經實物檢診係感染灰黴病。

防治方法（參考）：

- 1.以 70% 甲基多保淨可濕性粉劑稀釋 2,500 倍或 50% 撲滅寧可濕性粉劑 1,500 倍，每 7~10 天噴施一次。
- 2.注意通風剪枝管理。

七、西瓜葉片黑褐、有紅色分泌物，莖部有分泌膠物，不知何原因？（黃榮和·鳳榮地區農會）

答：經田間實物檢診係感染炭疽病與蔓枯病。

防治方法：

1.蔓枯病：以 21.2% 依滅利乳劑稀釋 2,000 倍，每 7~10 天一次，約 3~4 次。

2.炭疽病：以 24.9% 待克利乳劑稀釋 3,000 倍，每 7~10 天一次，約 3~4 次。

八、麵包樹枝條頂梢枯萎，易折不知何原因？（龔文俊·玉里鎮）

答：依所描述之症狀係受天牛為害所致。

防治方法（參考）：以 40.64% 加保扶水懸劑 400 倍，每 20 天噴施一次，約 2~3 次，但應特別注意施藥安全。