

農友信箱

陳朝欽 1998-09 花蓮區農業專訊 25:23

一、金針葉片上有黃色銹斑，不知何病？如何防治。（賴清華：花蓮縣吉安鄉）

答：葉片上之病斑係受銹病感染後的症狀。防治藥劑：可選用 47% 三得錳可濕性粉劑稀釋 1,000 倍於發病初期施藥，以後每隔 15 天施用一次，連續 4-6 次，採收前 21 天停止用藥，或 33% 鋅錳乃浦水懸粉劑稀釋 500 倍噴施，每隔 5-7 天一次，採收前 15 天停止用藥。

二、韭菜葉尖呈水浸狀並逐漸凋萎，不知何原因？（曾永金：花蓮縣吉安鄉）

答：葉片所呈現症狀係感染疫病所致。防治方法（參考）：在發病初期噴佈 80% 鋅錳乃浦可濕性粉劑稀釋 500 倍，每 5-7 天噴施一次或 72% 鋅錳克絕可濕性粉劑稀釋 500 倍，每 5-7 天噴施一次，並應注意安全採收期。

三、文旦樹幹受蟲蛀食後流膠，應如何防治？（王朝益：花蓮縣吉安鄉）

答：樹幹流膠係受星天牛為害後之症狀。

防治方法：

1. 挖開受害部後以棉花沾 40.64% 加保扶水懸劑原液堵塞洞口。

2. 每年 4-8 月以 40.84% 加保扶水懸劑稀釋 100 倍施於樹幹基部高度約 50 公分處，每個月施用一次，但應特別注意安全施藥，做好防護措施。

四、番茄結果期全株呈水浸狀，深褐色，不知是何原因？如何防治。（簡明志：花蓮縣富里鄉）

答：番茄感染晚疫病後即呈水浸狀，深褐色，並致萎凋狀。防治方法：選用 80% 免得爛可濕性粉劑稀釋 500 倍每 5-10 天噴施一次或 58% 鋅錳滅達樂可濕性粉劑稀釋 400 倍，每 7-10 天噴施一次並注意安全採收期。

五、甜椒果實受鳥啄食，如何預防？（瑞穗鄉）

答：甜椒果實是受烏頭翁啄食後失去商品價值。

預防方法（參考）：

1. 採驅離方式，如音爆（雷聲）。

2. 懸掛防鳥彩帶或磁波干擾（鳥不見）。

六、辣椒株梢褐枯落葉，果褐變生育不良，不知何原因？如何防治。（張鴻唐：花蓮縣壽豐鄉）

答：辣椒落葉及果實褐變，係感疫病之症狀。

防治方法：

1. 發病初期噴施 35% 依得利可濕性粉劑稀釋 2,000 倍，每 7-10 天噴施一次，採收前 20 天停止施藥。

2. 參考藥劑：58% 鋅錳滅達樂可濕性粉劑稀釋 400 倍，每隔七天噴施一次，採收前 7 天停用。