

農友信箱

陳朝欽 1998-06 花蓮區農業專訊 24:17

一、薑荷花之葉、莖上有深褐色斑點，受害後生長不良，花莖變型，無法正常開花，不知何原因？如何防治。王順平（吉安鄉）

答：經鑑定係赤斑病為害所致。

防治方法：

- 1.種球消毒，種球在種植前以 50%免賴得可濕性粉劑 2,000 倍浸種 30 分鐘加以消毒。
- 2.構築防雨設施，避免密植，增加通氣性及多施有機質肥料增加抵抗力。
- 3.已發病株建議參考使用 50%依普同可濕性粉劑每公頃一公斤稀釋 1,000 倍，加以噴施。

二、小胡瓜發育不良，葉片背面有煤污並有白色小蟲，稍一驚動即飛起，似白色灰塵，不知是何蟲，應如何防治？陳世湖（鳳林鎮）

答：經鑑定為銀葉粉蝨為害所致。

防治方法：

- 1.種植時避免過度密植及氫肥過量施用，可減緩粉蝨繁殖密度。
- 2.每葉超過 5 隻時建議參考施用：
 - (1)2%阿巴汀乳劑每公頃 0.5 公升稀釋 2,000 倍噴施，採收前 5 天停止用藥。
 - (2)2.8%畢芬寧乳劑每公頃 0.5 公升稀釋 2,000 倍噴施，採收前 9 天停止用藥。注意噴施葉片背面。

三、桑椹插植後枯死，不知何原因？如何防治。陳天來（花蓮市）

答：經實物檢查係受天牛為害後枯死。

防治方法：

- 1.取苗時先行檢查，未受天牛產卵或幼蟲為害枝條方可插植。
- 2.插植後參考以 40.64%加保扶水懸劑每公頃 2.5 公升稀釋 400 倍，噴佈插條預防天牛成蟲產卵，每個月施用一次。

四、聖誕紅葉片受白色蟲為害後乾枯，不知如何防除？花蓮機場（花蓮縣新城鄉）

答：經現場檢查聖誕紅葉片係受螺旋粉蝨為害後之症狀。

防治方法：

可參考施用 25%布芬淨可濕性粉劑稀釋 1,000 倍，注意噴施葉片背面。

五、豌豆葉片有彎曲白色食痕，並呈焦枯情形，不知何原因？如何防除。劉仁炎（鳳林鎮）

答：經檢查葉片係受番茄斑潛蠅為害的症狀。

防治方法：

發生初期以 8.9%賽滅淨溶液每公頃一公升，稀釋 1,000 倍或 75%賽滅淨可濕性粉劑每公頃 0.25 公斤稀釋 6,000 倍每隔七天施用一次，噴施 2~3 次，採收前七天停止用藥。