

農友信箱

陳朝欽 1998-03 花蓮區農業專訊 23:24

- 一、黑板樹葉片褐變、黃化、生育不良，不知是何因？如何防治。王建章（花蓮縣鳳林鎮）
答：經實物檢診係感染褐腐病。防治方法（參考）：高溫多濕時易發生，初發病時以 56% 貝芬硫昆可濕性粉稀釋 1,000 倍或 18.6% 賽福寧乳劑 1,000 倍每隔 10 天施用一次，連續 3 次。
- 二、黑板樹葉片上有毛狀蟲嚙食另有葉受害成捲葉狀，如何防治？王建章（花蓮縣鳳林鎮）
答：經實物檢視係受台灣黃毒蛾及捲葉蛾為害。防治方法（參考）：害蟲發生時以 75% 硫敵克可濕性粉劑稀釋 3,000 或 24% 納乃得溶液 1,000 倍施用，每隔七天一次，施用 1~2 次。
- 三、水稻穗上有黃綠色小菌塊，不知何物？如何防治。鄭金昌（花蓮縣壽豐鄉）
答：經實物檢診係感染稻麴病。防治方法（參考）：1. 選用無病原稻種，生長期中勿偏施氮肥。2. 剪除病穗。3. 抽穗前噴施 80% 鋅錳乃浦可濕性粉 400 倍或 50% 免賴得可濕性粉劑 1,500 倍一次，齊穗期再噴一次。
- 四、銀柳葉背有蟲體活動，生育不良，如何防除？林龍水（花蓮縣吉安鄉）
答：經實物檢視係受二點葉蟊為害。防治方法（參考）：1% 密滅汀乳劑 1,000 倍或 2.8% 畢芬寧乳劑 2,000 倍，每隔 7 天噴施一次，連續 2~3 次。
- 五、薑地際莖部呈黃褐軟腐，地上部萎黃枯死，不知何病？如何防治。戴珠生（花蓮縣吉安鄉）
答：經實物檢視係感染軟腐病。防治方法：發病初期以 25% 依得利乳劑稀釋 1,500 倍，每平方公尺灌注 3 公升，每隔 10 天灌注一次，未發病地區噴灑地表均勻濕潤即可，採收前 30 天停止用藥。
- 六、蘆筍莖部有褐色病斑，感染後枯死，不知何原因？如何防治。李進崑（花蓮市）
答：經檢視病株係莖枯病為害後症狀。防治方法：1. 田間衛生：割除老莖燒毀之，並清除田埂雜草。2. 採用 33% 鋅錳乃浦水懸粉 600 倍或 40% 腐絕可濕性粉 2,000 倍，於割除老株後 7 天施藥，每隔 20 天施一次，共 3 次。
- 七、薑心部枯萎，不知何原因？如何防治。艾義（花蓮縣秀林鄉）
答：經現場觀察係受螟蟲為害。防治方法（參考）：於螟蛾出現後 7 天開始施用 50% 撲滅松乳劑 1,000 倍或其他防治螟蟲的藥劑，每 7 天施一次，連續三次。
- 八、桃葉片上出現黃色小斑點，背面則為褐色泡狀小點，是何病症？如何防治。呂俊慶（花蓮縣秀林鄉）
答：經實物檢診係感染銹病。防治方法（參考）：發病初期施用 75% 四氯異苯晴可濕性粉劑 600 倍或 75% 嘉保信可濕性粉 1,500 倍噴施，每隔 7 天一次共 2~3 次。
- 九、食用甘蔗莖有蟲孔，係何蟲為害？如何預防。許苗（壽豐鄉）

答：經實物檢視係受蔗螟為害。防治方法（參考）：1.幼株時噴施 50%撲滅松乳劑 1,000 倍每隔 7~10 天一次，共二次。2.株高約 45 公分時釋放赤眼卵寄生蜂片每公頃每次 100 片，每隔 7 天釋放一次，共釋放 5~6 次。

十、番茄園區銀白色小蟲飛躍不知何蟲？如何防治。徐仁光（花蓮縣鳳林鎮）

答：經其敘述情形判斷，番茄園區係受銀葉粉蝨為害。防治方法：1.以 2.8%畢芬寧乳劑 1,000 倍液，於早晨或傍晚時噴施於番茄葉面、葉背每隔 5~7 天一次，約 2~3 次，應注意安全採收期。2.鄰近雜草、田埂及低矮林木，均應同時施藥。