

農友信箱

陳朝欽 1997-12 花蓮區農業專訊 22:24

一、樟樹果實表面佈滿深褐色粉狀物，果實略膨大狀，不知何原因？(賴美麗：花蓮縣鳳林鎮)

答：經鏡檢結果為 *Exobasidium sawadae* 所引起粉實病。

防治方法：參考施用 84.2%三得芬乳劑稀釋 2,000 倍。

二、番石榴果實上有疣狀並形成淺褐色斑，重者木栓化，不知何病？如何防治。(黃文慶：吉安鄉)

答：經檢查實物係感染瘡痂病。

防治方法：

參考方法，果實以 50%撲克拉錳 3,000 倍或 56%貝芬硫昆 800 倍施用後再實行套袋。

三、酪梨枝幹有銀白色物圍繞，重者會落葉，請問是何病？如何防治。(黃文慶：花蓮縣壽豐鄉)

答：經檢查實物係感染赤衣病。

防治方法：

1.適當整枝，使通風良好，日照充足。

2.發病初期噴施 50%貝芬同可濕性粉劑 750 倍或 63%銅鋅錳乃浦可濕性粉劑 500 倍，每 10-14 天一次至八月底止。

四、酪梨根部皮層褐或黑色，皮層鬆軟，樹勢衰弱，矮化等症狀，是何原因？如何防治。

答：依其症狀係感染根腐病。

防治方法：

1.改善排水設施。

2.施肥時應避免傷及根部。

3.灌施藥劑：25%依得利乳劑 2,000 倍或 35%依得利可濕性粉劑 2,500 倍液灌注根際部，每 10-14 天一次，共 2-3 次。

五、釋迦葉片背部凹陷畸型，受害部位在白色並有蟲體活動，如何施藥防治？(柯能職：花蓮縣新城鄉)

答：經鏡檢結果係受二點葉蟊為害。

防治方法：

參考以 2.8%畢芬寧乳劑 1,500 倍或 50%芬佈賜可濕性粉劑 1,500 倍或 20%三亞瑞乳劑 1,000 倍在蟲體初發生時施用以後隔 7-10 天再施用，共 3 次。

六、金柑枝幹、細條分泌流膠，如何防範？(宜蘭縣礁溪鄉)

答：經實物鑑定係感染流膠病。

防治方法：

1.樹幹地際部應以草生或敷蓋廢紙盒片。

2.每一季根際部位撒施 5%滅達樂粒劑。

3.兩期噴施 63%銅鋅錳乃浦可濕性粉 500 倍，每隔七天一次共 2-3 次。

七、冬瓜植株矮小，根部有瘤狀物是何原因？(林兩傳：花蓮縣吉安鄉)

答：經鑑定係根瘤線蟲為害造成。

防治方法：

1.避免與瓜類連作。

2.被感染植株拔除燒毀。

3.參考藥劑以 10%芬滅松粒劑每公頃 15 公斤施於植溝內，覆土後再種植。