

## 農友信箱

### 陳朝欽 1997-09 花蓮區農業專訊 21:24

一、甜椒葉片上有小圓型暗綠色斑點，斑點會互相癒合導致落葉枯乾，不知何病？如何防治。

（陳秀吉：花蓮縣鳳林鎮）

答：經檢視樣本係罹患細菌性斑點病。

防治方法：

- 1.發病初期以 81.3%嘉賜銅可濕性粉劑 1,000 倍或 27.12%三元硫酸銅 FP500 倍噴佈後每隔 7 天施藥一次，連續 2~3 次。
- 2.採收前 3 天停止用藥。

二、辣椒植株頂芽部分生育萎縮、結果不良，請問是何原因？如何防治。（陳秀吉：花蓮縣鳳林鎮）

答：經檢視實物係受細蟎為害所致。

防治方法：

- 1.可於初發生時以 25%新殺蟎乳劑 500 倍噴佈，隔 7~10 天再噴一次。
- 2.採收前 15 天停止用藥。

三、庭園內花木葉背有白色小蟲，會飛，不知何蟲？（花蓮縣玉里國小）

答：經檢視樣品係受螺旋粉蝨為害。

防治方法：

- 1.疏剪枝條保持通風，並剪除燒燬嚴重被害株。
- 2.施用 2.8%畢芬寧乳劑 1,000 倍，連續噴施 2~3 次。

四、國蘭葉片內側呈黑褐色斑是何病？如何防治。（許樹枝：花蓮縣吉安鄉）

答：經檢視實物係感染炭疽病引起。

防治方法：

- 1.避免噴灌水滯留芽部。
- 2.栽培環境應保持通風良好，並於早晨適當給水。
- 3.新芽長出時施用保護藥劑甲基多保淨或鋅錳乃浦等 600 倍預防病害發生。

五、番荔枝葉片上有不規則褐色斑點，受害後期葉片枯萎，不知何原因？（黃紹奎：花蓮縣吉安鄉）

答：經檢驗係由 *Mycosphaerella* sp.引起之葉斑病。

防治方法（參考藥劑）：

發病初期以 80%免得爛可濕性粉 750 倍或 25%克熱淨 S800 倍每 7~10 天施藥一次，或以 33%鋅錳乃浦 FP400~500 倍每 5~7 天施用一次。

六、水蜜桃 4~7 月間受獼猴為害，如何有效防範？（黃玉麟：花蓮縣新秀地區農會）

答：建議採取驅趕方式驅離，以音爆驅趕器定時音爆驚嚇避免猴群接近果園為害。

七、苦瓜莖蔓萎縮，葉小不伸長，是何原因？如何防治。（林進樹：花蓮縣瑞穗鄉）

答：經採樣檢視係受葉蟥為害所致。

防治方法：

目前尚無正式推廣藥劑，可參考蔬菜類殺蟥劑，先小區試噴無藥害後再行使用，藥劑應輪流施用並注意安全採收期。