

農友信箱

陳朝欽 1997-06 花蓮區農業專訊 20:23

一、山蘇葉片佈滿白點，不知何物？（陳君鄉：花蓮縣壽豐鄉）

答：經鏡檢係牡蠣介殼蟲附著葉片。

防治方法：

40%滅大松乳劑(參考藥劑)稀釋 1,000 倍，先行小區試噴無藥害後大面積施用，應注意安全採收期。

二、龍眼樹枝條有腊狀物附著，葉片變黃枯死脫落，有白絮狀分泌物及煤污，不知何物？（何松和：吉安鄉）

答：經檢查實物係受膠蟲為害所致。

防治方法：

1.施藥前將受害嚴重及枯枝剪除燒燬。

2.噴施 44%大滅松乳劑 1,000 倍在冬季 1~2 月每隔 7 天施藥一次，連續 2 至 3 次，若施藥後仍有成蟲出現時，防治藥劑應再加入 95%夏油 150 倍混合噴施。

三、黃藤嫩莖心部枯萎，有蟲孔，不知如何防治？（王碧雪：富里鄉）

答：依症狀描述係受筍象鼻蟲為害所致。

參考防治方法：

1.檢視園區若有枯心應剝取心部，捕捉幼蟲，3 至 6 月應特別小心。

2.選擇下列藥劑以高壓噴霧機噴佈，47.3%大福松乳劑每公頃 1.5 公升稀釋 700 倍或 40.8%陶斯松乳劑每公頃 1 公升稀釋 1,000 倍，或 25%滅賜松乳劑每公頃 1.2 公升稀釋 1,000 倍。

3.施藥後應特別注意安全採收期。

四、報歲蘭葉片焦枯，葉斑呈褐色圓形中央稍淡色，葉斑呈不規則形灰黑色，不知何病？（吳惠亮：宜蘭縣頭城鎮）

答：1.葉尖焦枯主要原因為鹽類累積引起，預防方法宜盡量減少污染源。

2.葉斑呈褐色圓形，中央稍淡色係炭疽病，防治法可參考以 25%撲克拉乳劑 3,000 至 4,000 倍(注意濃度勿超過)，或 70%四氫保淨可濕性粉劑 500 倍或 70%甲基多保淨可濕性粉劑 1,000 倍，但應注意將病葉剪除，減少噴水。

3.葉斑呈灰黑色不規則狀乃感染疫病，防治法，注意噴水量勿過多以減少傳染，藥劑可使用 66.5%普拔克溶液 1,000 倍或 33.5%快得寧水懸劑 1,500 倍防治，但七天內不宜噴水，另剪除病葉，傷口處理 33.5%快得寧水懸劑 2 倍液，以預防感染。