

農友信箱

陳朝欽 1997-03 花蓮區農業專訊 19:23

一、辣椒果實有褐色斑點，病斑向下凹陷並密佈黑色小點，究係何病？如何防治？（彭田生：吉安鄉）

答：經檢視樣品係炭疽病為害後症狀。

防治方法：

1.清除田間發病株或殘株。

2.藥劑可以 22.7%晴硫錳水懸粉 700 倍於發病初期施藥，以後每隔 10 天一次，共三次，並加展著劑，採收前 4 天停止施藥。

二、蘭花莖基部呈水浸狀、褐色是何原因？如何防治？（花蓮市）

答：經檢視實物感染疫病後之症狀。

防治方法：可任選下列藥劑施用：

(1) 66.5%普拔克溶液稀釋 1,000 倍於發病初期開始每隔 7 天施藥一次。

(2) 33.5%快得寧水懸粉稀釋 1,500 倍，發病時施第一次藥，隔 7 至 10 天再施藥一次(施藥後 7 天內不宜噴水)，該藥劑試驗時用萬代蘭做材料。

三、茄冬樹葉片表皮、葉肉被蟲嚙食嚴重，如何防治？（新城鄉）

答：經觀察所送之樣品係受梨偽毒蛾幼蟲為害所致。

防治方法：

參考藥劑：於蟲害發生初期可選 75%硫敵克可濕性粉劑 3,000 倍或 24%納乃得溶液 1,000 倍施用一次即可，但庭園地區施藥應注意安全。

四、胡瓜葉片有水浸狀不整形斑點或角斑，會破裂呈小洞，不知是何病？如何防治？（羅運金：吉安鄉）

答：經實體檢視係受細菌性斑點病為害所致。

防治方法：

發病初期以 40%銅快得寧混合可濕性粉劑，每公頃 2 至 3 公斤，稀釋 500 倍，加展著劑 1,000 倍每隔 7 天施用一次，連續 3 至 5 次，藥劑應噴於葉片上、下兩面，採收前 3 天停止施用。

五、薑地下塊莖軟腐並有臭味，不知何原因？（載珠生：吉安鄉）

答：經實物診斷係罹薑軟腐病。

防治方法：

發病初期以 25%依得利乳劑稀釋 1,500 倍灌注園圃土壤每平方公尺 3 公升，每隔 10 天一次，採收前 30 天停止施藥。