

農友信箱

陳朝欽 1996-12 花蓮區農業專訊 18:23

一、日日春葉片呈現圓形斑，外緣紫色中央淡褐色大小不一之斑點，是何種病害？如何防治？

答：經鏡檢結果為鏈格胞菌 *Alternaria* sp 所引起的病害。防治方法：1.注意通風良好，葉面勿留水分。2.藥劑可參考其他作物防治葉部病害的藥劑如甲基多保淨、普克利、四氯異苯晴、鋅錳乃浦、依普同任選一種，參閱說明事項，並先行小區試噴，觀察藥效及藥害情形，再行大規模施用。

二、芋葉背近葉脈部位呈白色斑，黃化皺縮枯死，不知何原因？（吉安鄉）

答：經實地觀察係受葉蟎（紅蜘蛛）為害所致。防治方法：建議採用 25% 歐殺松乳劑稀釋 1,000 倍，或 18.5% 大克瑞可濕性粉 500 倍，或 35% 芬佈克瑞可濕性粉劑 500 倍，每隔七天一次，藥劑宜輪流施用。

三、芋葉片上有同心圓型大病斑，周緣紫色水浸狀，並有白色狀物，或中央乾枯破裂，不知何原因？（吉安鄉）

答：經觀察係感染疫病。防治方法：於發病初期建議選用 33% 鋅錳乃浦水懸劑稀釋 500 倍或 35% 依得利可濕性粉劑 2,000 倍或 58% 鋅錳滅達樂可濕性粉劑稀釋 500 倍，每隔七天施用一次，遇雨天時宜增加施藥次數並酌加展著劑噴施。

四、薑地際部莖葉黃褐軟腐，後期黃化枯死不知是何病因？如何防治。（戴珠生：吉安鄉）

答：經實地診斷係受真菌性軟腐病感染所致。防治方法：藥劑選用 25% 依得利乳劑稀釋 1,500 倍或 35% 依得利可濕性粉劑 2,500 倍，每平方公尺灌注 3 公升，每隔 10 天一次，施於發病地四周，未發病地區以噴灑方式使土表均勻濕潤為止，採收前 30 天停止用藥。

五：酒瓶椰子葉片背部發現圓錘形淡褐色物體附著，葉片漸枯黃，不知何蟲？如何抑制蔓延。

答：經鑑定係「白腳避債蛾」之蟲袋附著，幼蟲為害葉片後的情形。防治方法：可採用 80% 三氯松可溶性粉劑稀釋 600 倍或 50% 加保利可濕性粉劑 800 倍或 25.3% 美文松乳劑 1,000 倍於幼蟲發生時施用。