

農友信箱農業諮詢

陳朝欽 1996 花蓮區農業專訊 16:24

一、木瓜葉柄有絲狀病斑，葉枯萎，不知何原因？如何防治？王化威：花蓮市

答：經鏡檢結果係真菌病原 *Cercospora mamaonis* Viegas 引起葉枯病。防治方法：1.注意氮肥適量施用及剪除被害部搬離園區。2.可參考以 80% 鋅錳乃浦可濕性粉 400 倍或 70% 甲基鋅乃浦可濕性粉 400 倍或 33% 鋅錳乃浦水懸粉劑 400 倍，每七天一次，共 3 次，並酌加展著劑 CS-73000 倍

二、水稻插秧後受雁鴨為害，如何驅趕？黃清標：富里鄉

答：建議向鄉公所農業課申購音爆驅鳥器，每 2.5 公頃佈置一組，夜間開啟，80—120 分貝量，或螢光彩帶每公頃 20 卷左右，或閃光驅鳥器、每公頃二盞，紅、黃、藍三色組合，夜間啟用。

三、文旦柚上方葉片黃化，不知何原因？如何處理？吳建二：花蓮縣吉安鄉

答：經現場觀察係營養缺錳之情形。改善方法建議：1.降低土壤鹼性，可施用硫酸銨緩和。2.施用含錳成份微量原素如硫酸錳 0.5—1.0% 並酌加石灰於葉面或 80% 錳乃浦可濕性粉 400 倍液，每隔 7—10 天噴一次，直到症狀消失為止。

四、果蠅密度高如何預防，減少為害？猴子侵害水蜜桃，如何防範？李建業：花蓮縣吉安鄉

答：1.果蠅可以甲基丁香油誘殺板每公頃 4 個掛於果園外陰蔽樹枝下，離地面 1.5 公尺，二個月換一次，並清理落果裝入塑膠袋內，另可放置果蠅喜好之果實混合納乃得可濕性粉 2000 倍誘殺。2.猴子侵害水蜜桃可利用音爆(雷公炮)之聲驅趕，每 2 公頃設置一個。

五、白花品系玫瑰花枝上有腫瘤物，如何滅除？許國鋒：吉安鄉

答：經實物檢視係感染細菌性腫瘤病。防除方法：1.挖除罹病株焚燬。2.剪枝用具採用漂白水或酒精液消毒。3.採用無病原種苗。

六、青蔥葉片有銹斑、褐斑，不知何原因？楊瑞堂：花蓮縣壽豐鄉

答：1.青蔥葉片有銹斑係受銹病感染所致，防治藥劑可施用 23% 三泰隆乳劑 2000 倍液。2.青蔥葉片有褐斑係受紫斑病感染所致，防治藥劑可施用 23.7% 依普同水懸劑 1000 倍液，採收前 15 天停止施藥。