

農業諮詢農友信箱

陳朝欽 1995 花蓮區農業專訊 14:24

一、楓香樹葉背有粉狀物，葉片枯黃凋落，不知受害原因?(陳如坤：吉安鄉)

答：經鏡檢係受粉蝨為害所引起之徵狀。防治方法：建議參考 1.栽種新株時先予檢查；避免蟲原存在。2.清除栽種園區雜草及去除植株下位葉。3.選用 25%布芬淨可濕性粉 1,000 倍，每 7-10 天噴施一次，並可與 50%馬拉松 800 倍、47%得拉松 1,000 倍等藥劑輪流施用。

二、番荔枝枝條有分泌腊質附著皮上，並有煤污情形，不知何原因?(沈四妹：吉安鄉)

答：經實物檢視係受膠蟲為害的症狀。防治方法：1.建議參考 44%大滅松乳劑稀釋 1,000 倍或 50%撲滅松乳劑 1,000 倍噴施於若蟲棲息部位。2.施藥前剪除枯枝及受害嚴重枝條燒燬。

三、文旦柚葉片黃化，根系根皮層與維管束分離脫落，根部褐變腐敗，請問是何病因？如何防治?(楊坤海：瑞穗鄉)

答：經染色鏡檢結果為柑桔線蟲為害。防治方法：建議土壤混合幾丁質(使用量為每公頃 3,000 公斤)，以增加土內加線蟲天敵，減少線蟲密度，並在樹冠外圍環狀開溝 15 公分深，施用 30%滅線蟲粒劑(每公頃 28 公斤)或 10%芬滅松粒劑(每公頃 30 公斤)，或 5%丁基加保扶粒劑(每公頃 80 公斤)或 10%托福松粒劑(每公頃 20 公斤)，文旦植株大小狀況加以增減施於溝底，覆土並保持適當濕度。

四、甜椒植株枝條呈水浸狀，褐色病斑，上端萎凋成枯枝狀。(吳錦坤：吉安鄉)

答：經實體檢診係感染疫病。防治方法：建議選用 25%依得利乳劑稀釋 2,500 倍，於發病初期噴施，每 5~7 天一次，採收前 20 天停止施藥。

五、梅、李、桃樹主幹及枝條上出現棕褐色或黑色之膠狀樹脂堆積物，不知是何物？應如何處理。(李振中：富里鄉)

答：經實體檢視係感染流膠病。防治方法：1.注意田間衛生管理。2.選擇 50%貝芬同可濕性粉劑稀釋 750 倍或 25%比多農可濕性粉劑稀釋 5,000 倍或 50%免賴得可濕性粉劑 1,500 倍，發病時每 10~14 天噴施一次。