

農業諮詢

陳朝欽 1995 花蓮區農業專訊 13:23

一、朱蕉葉片自葉尖向內乾枯，呈褐色，病斑中央白化不知是何病因？如何防治。(楊春地：宜蘭縣三星鄉)

答：經鏡檢係葉斑病 (*Phyllosticta* sp.)引起之病狀。防治方法：建議使用 50%免賴得可濕性粉劑稀釋 1,500 倍噴施。

二、梅樹主幹、枝條上有棕褐色或黑色膠狀樹脂堆積物，樹勢弱或枯死，不知是何原因？如何防治。(李興原：花蓮市)

答：依症狀係受流膠病原感染後之情形。防治方法：1.切除患部及剪除枝條燒燬。2.噴施 50%貝芬同可濕性粉劑 1,500 倍或 50%免賴得可濕性粉劑 1,500 倍，隔 14 天再噴一次。

三、桃樹新芽流出少量膠脂後萎凋枯死是何原因？如何防治？(李興原：花蓮市)

答：經檢查受折心蟲為害後之症狀。防治方法：參考施用 2.8%賽洛寧乳劑或 3%亞滅寧乳劑 1,000 倍液。

四、玉米株出現軟體蟲為害，請提供防除方法。(張吉盛：富里鄉)

答：經現場勘察係受蛭蟪為害。防除方法建議：1.清除田園區雜草或堆積之廢棄物。2.以 6%聚乙醛餌劑，每公頃 10 公斤全面施用，或參考選用 2.8%畢芬寧乳劑 2,000 倍液。

五、黃藤有那些害蟲？栽培技術有資料可參考嗎？(陳墾用：花蓮縣瑞穗鄉)

答：主要害蟲有台灣大象鼻蟲為害心部嫩莖。防治方法可參考施用 40.8%陶斯松乳劑 1,000 倍。黃藤栽培書面資料附寄。

六、冬瓜葉片褐色斑後乾枯是何病？如何防治。(黃昆生：瑞穗鄉)

答：經觀察冬瓜葉係受炭疽病為害之症狀。防治方法可採用 65%鋅錳乃浦可濕性粉 500 倍或 80%銅合浦可濕性粉劑 500 倍，另可參考施用 24.9%待克利乳劑稀釋 3,000 倍。

七、百合葉片有水浸狀斑後褐變，不知是何原因？如何防治。(徐雲林：花蓮縣壽豐鄉)

答：經現場實物觀察係灰黴病為害症狀。防治方法：參考施用 50%免克寧可濕性粉劑 1,500 倍液，每七天施用一次，連續 3-4 次。