

## 農業諮詢

### 陳朝欽 1995 花蓮區農業專訊 12:23

一、蝴蝶蘭灰黴病應如何防治？(陳文和：鳳林鎮)

答：蘭花灰黴病可利用 70% 甲基多保淨可濕性粉稀釋 2,500 倍於發病初期開始施藥，以後每隔 10 天施用一次，連續三次。另可參考以撲滅寧、快得保淨、免克寧、鋅錳乃浦、四氫異苯睛等藥劑。

二、芹菜種子帶斑點病原菌，應如何處理種子？(林士雄：花蓮縣吉安鄉)

答：建議參考以 50% 依普同可濕性粉或 50% 免賴得可濕性粉或 50% 撲克粒錳可濕性粉劑每公斤種子用 3 公克藥量拌種後再行播種。

三、萬代蘭葉片上有許多白色凹陷小斑點，有些呈圓形，有些則癒合成不規則狀，請問是何病因？如何防治。(林錦育：宜蘭縣五結鄉)

答：經 ELISA 檢定結果 CYMV(喜姆比蘭嵌紋病毒)感染。因應對策立即將該病株隔離銷燬，並加強檢驗園內其他植株是否有被感染，採取防範蔓延措施。

四、國蘭花芽枯萎、葉片有褐斑、心葉褐化，不知何原因？(張秀文：新竹縣橫山地區農會)

答：經檢視結果國蘭花苞及葉片受薊馬為害，致花苞褐化枯萎，葉片因受害傷口再感染炭疽病，產生褐色至灰褐色凹陷斑，甚至葉片整個腐爛褐化。防治方法：應澈底防治薊馬，可參考施用加保扶粒劑，每盆(6 吋盆)約 1 公克並直接防治炭疽病參考施用 25% 撲克拉乳劑 3,000 倍或 70% 快得保淨 700 倍。

五、水稻葉緣及葉尖部呈淡黃白色，有不規則缺口或捲曲，係何原因？(陳文武：吉安鄉)

答：經害抑檢視係受稻心虻為害，防治方法：(任選下列一種藥劑噴施一次即可) 2.25% 陶斯松乳劑每公頃施 1~1.1 公斤稀釋 750 倍。3.5% 必芬松粉劑每公頃施 50~55 公斤。