

農友信箱

陳朝欽 1994 花蓮區農業專訊 9:28

- 一、
- 1.青蒜心葉部位呈腐爛狀，具惡臭，是何病症，如何防治？（龔偉年：花蓮市）
 - 2.花胡瓜根部及地基部枯萎害，地上莖部為水浸狀，上有白色黴狀物，不知何原因？
 - 3.萵苣葉背產生白色黴狀物，葉片黃化，提早落葉是何原因？
 - 4.芥菜葉片上有許多灰白色多角形病斑，請問是什麼病原？如何防治。（曾永坤：吉安鄉）

答：1.青蒜經鑑定係軟腐病為害，防治方法可參考以 68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑稀釋 1,000 倍施用，在採收前 12 天停止用藥。

2.花胡瓜經鏡檢結果受疫病為害，應立即清除田間病株燒燬之，在病株周圍植株立即灌注 25%依得利乳劑 1,500 倍或 35%依得利可濕性粉劑，2,000 倍，每株 500CC，每 7~10 天灌一次，連續 3~5 次，採收前 6 天停止施藥。

3.萵苣經鑑定係受白粉病為害所致，防治藥劑可參考以 10.5%平克座乳劑稀釋 4000 倍先行小規模試驗，無藥害具有藥效後方可大規模施藥，應注意勿提高施藥濃度並在採收前 6 天停止用藥。

4.芥菜經鑑定係受露菌病為害，可參考任選下列一種藥劑：65%鋅乃浦可濕性粉劑 400 倍液，80%錳乃浦可濕性粉劑 400 倍，48%松香酯酮 1,000 倍液，72%鋅錳克絕可濕性粉劑 750 倍，並注意各藥劑說明安全採收期。

- 二、
- 1.絲瓜苗葉片濃綠且易碎，心葉萎縮，子葉褐色斑點，不知何原因？

2.青蒜葉上有少數紫色病斑是何病？（黃欽當：吉安鄉）

答：1.絲瓜葉片濃綠易碎，心葉萎縮可能係噴施 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑，兼以近日低溫寒害所致，建議改用 50%免賴得可濕性粉劑 1,500 倍防治葉片上蔓枯病，子葉若帶菌宜剪除後施藥。

2.青蒜葉上病斑係紫斑病建議噴施 75%四氫異苯睛可濕性粉劑 400 倍液，採收前 7 天停止用藥。

- 三、枸杞葉片背面凸起，正面凹陷，是何原因？（陳錦龍：花蓮市）

答：經診斷受白銹病為害所致，目前尚無推薦藥劑，建議參考以 75%嘉保信可濕性粉劑 4,000 倍或 25%嘉保信乳劑 1,000 倍液每 10 天噴施一次。

- 四、甜椒葉部有黑色斑點，漸擴大不知是何病狀？如何防治？（花蓮縣瑞穗鄉）

答：經實體檢查結果受細菌性斑點病感染為害所致，建議參考以 10%鏈四環黴素 1000 倍噴施。