

農民信箱

陳朝欽 1994 花蓮區農業專訊 8:24

一、大蒜根部發育不良，葉部逐漸黃化，不知何原因？（游健在：吉安鄉）

答：經實體檢查係受「根蹣」為害，防治方法建議參考用 24% 毆殺滅溶液 750 倍灌注根基部，每 14 天一次，應注意採收前 14 天停止用藥。

二、木瓜葉背有蟲體吸取汁液，使葉片粗糙變黃、焦枯，請問如何防除？（嚴永隆：吉安鄉）

答：經現場檢視係受紅葉蹣為害的現象，建議參考施用 25% 滿離丹可濕性粉劑 1,000 倍，或 50% 芬佈賜可濕性粉劑稀釋 1,500 倍，每隔 10~15 天噴佈葉背一次，連續 2~3 次，並勿任意提高濃度以防藥害發生。

三、非洲鳳仙花植株矮化，葉片捲曲無法展開，不知何原因？（羅進福：吉安鄉）

答：經觀察結果係早期受薊馬為害，使植株在後期伸展不良，此蟲在高溫乾燥時為害甚烈，應加強防治，防治藥劑可參考下列一種施用。40.8% 陶斯松乳劑 1,500 倍，50% 達馬松乳劑 2,000 倍，5.3% 美文松乳劑 1,000 倍，24% 納乃得溶液 1000 倍，70% 加保扶可濕性粉 2,000 倍，2.8% 畢芬寧乳劑 1,000 倍。

四、1. 青蒜心葉部位呈腐爛狀，具惡臭，是何病症，如何防治？

2. 花胡瓜根部及地際部枯萎，地上莖部為水浸狀，上有白色黴狀物，不知是何原因？

3. 萵苣葉背產生白色黴狀物，葉片黃化，提早落葉是何原因？

4. 芥菜葉片上有許多灰白色多角形病斑，請問是什麼病原？如何防治？（曾永坤：吉安鄉仁里村中正路一段 78 號）

答：1. 青蒜經鑑定結果被軟腐病為害，防治方法可參考以 68.8% 多保鏈黴素可濕性粉劑稀釋 1,000 倍施用，在採收前 12 天停止用藥。

2. 花胡瓜經鏡檢結果受疫病為害，應立即清除田間病株燒燬之，在病株周圍植株立即灌注 25% 依得利乳劑 1,500 倍或 35% 依得利可濕性粉劑 2,000 倍，每株 500cc，每 7~10 天灌一次，連續 3~5 次。採收前 6 天停止施藥。

3. 萵苣經鑑定係受白粉病為害所致，防治藥劑可參考以 10.5% 平克座乳劑稀釋 4,000 倍先行小規模試驗，無藥害具有藥效後方可大規模施藥，應注意勿提高施藥濃度並在採收前六天停止用藥。

4. 芥菜經鑑定係露菌病為害，可參考任選下列一種藥劑：65% 鋅乃浦可濕性粉劑 400 倍液，80% 錳乃浦可濕性粉劑 400 倍，48% 松香酯酮 1,000 倍液，72% 鋅錳克絕可濕性粉劑 750 倍，並注意各藥劑說明安全採收期。