

農友信箱

陳朝欽 1993 花蓮區農業專訊 6:34

一、斗柚葉片透明並有水浸狀綠色斑點、表皮破裂是何原因，如何防治？星天牛為害如何防治？（張仁宗：花蓮縣吉安鄉）

答：1.經檢視葉片係受潰瘍病病菌為害。建議選用 56%氯化亞銅可濕性粉劑稀釋 600 倍或 63%銅鋅錳乃浦可濕性粉劑稀釋 400 倍，每隔 15~20 天施用一次。

2.星天牛防治：

(1) 在成蟲出現前在樹幹自地面至 1 公尺處塗佈石灰乳，以防產卵。

(2) 4~5 月間成蟲出現時用 40.64%加保扶水懸粉劑 100 倍，噴施於距地面 45 公分樹幹基部，每隔一個月施用一次，至 8 月止。

二、檸檬葉片有細小透明水浸狀綠色斑點是何原因？如何預防。新梢幼葉有曲折線圖、捲縮不展，是何原因？如何施藥？（吳少英：花蓮縣吉安鄉）

答：經診察樣品係感染潰瘍病及潛葉蛾為害。

防治方法：

潰瘍病可參考前述藥劑施用。潛葉蛾可選用 25%佈飛賽滅寧乳劑稀釋 1,000 倍或 30%福隆納乃得水懸劑 1,500 倍，於新芽萌發時開始施藥，七天後再施一次。

三、百香果綠色幼果畸形且不易成熟，葉片呈現嵌紋狀是何原因？如何預防。（陳玉樹：花蓮縣光復鄉）

答：經現場採集實物診察，係感染木質化毒素病。

建議：

1.選用健康無毒苗種植，適期防治蚜蟲，人手、工具避免污染傳播病毒。

2.另充分供給營養（特別是有機質肥料），並注意預防乾旱。

3.砍除病株，減少感染源。

四、柑桔（文旦、斗柚）果實腐爛，落果是何原因？如何防治？（陳飛光：花蓮縣吉安鄉）

答：經現場診察係受東方果實蠅為害而引起之落果現象。

建議：每公頃懸掛「含毒甲基丁香油」中興誘殺器 4 個，誘殺雄性果蠅，並經常檢視，適時補充誘劑。

五、辣椒果實乾枯現象不知何原因？應如何防治。（陳興：花蓮縣壽豐鄉）

答：經檢視實物係炭疽病為害之症狀。

防治方法：

於發病初期以 22.7%晴硫琨水懸劑稀釋 700 倍加展著劑噴佈，每 10 天一次共 3 次。並應注意安全採收期，採收前 4 天停止施藥。