

農友信箱

陳朝欽 1993 花蓮區農業專訊 5:21

一、文旦柚葉片黃化不知何原因？頂葉成尖狀、厚化不知何原因？如何治療。（謝榮華：花蓮縣光復鄉）

答：葉片黃化經檢查結果係缺鐵症狀，防治對策 1.葉面噴施 0.5~1.0%硫酸亞鐵，並酌加消石灰，每七天噴一次到症狀消失為止。2.開溝條施硫黃粉每公頃 1,000~1,500 公斤。3.多施堆肥。葉片尖狀、厚化係受除草劑嘉磷塞藥害，可改用人工除草或其他種類除草劑，施用時注意安全使用方法。

二、木瓜葉及葉柄著生白粉是何病症？如何防治。（鄭國豐：花蓮縣吉安鄉）

答：經察實物係受白粉病為害情形，防治方法建議於發病初期選用 10.5%平克座乳劑稀釋 600 倍或 18.6%賽福寧乳劑 1,000 倍加"展著劑 CS-7" 3,000 倍每 14 天施藥一次，施藥濃度不可任意提高。

三、蘿蔔葉片突起，株萎縮，生育停止，是何症狀？如何防治。（載瑞生：花蓮縣吉安鄉）

答：經實地檢視株體，係感染嵌紋病毒，目前尚無藥劑可治療，建議輕症株酌施追肥促進生育，重症株則拔除並燒毀，注意園區衛生，拔除十字花科雜草與適期驅除蚜蟲。

四、菜豆葉片葉綠素消失，並出現灰白色微小斑點，是何原因？（黃欽當：花蓮縣吉安鄉）

答：經實地檢查係受赤葉蟬為害後的症狀。防治方法建議選用 18.5%大克滿可濕性粉劑每公頃 2 公斤稀釋 500 倍或 35%芬佈克蟬可濕性粉每公頃 2 公斤稀釋 500 倍噴施，每 7~10 天施用一次，採收前七天停止用藥。

五、青蔥葉片呈白色食痕，鱗莖腐敗，葉片枯萎，是何原因？如何預防？（廖芳仁：花蓮縣吉安鄉）

答：經現場實地檢查係受蔥潛蠅為害。防治方法建議於種植溝內施用 5%二硫松粒劑每公頃施用 40 公斤或 5%大福松粒劑每公頃施用 40 公斤，施用時必須戴手套，土壤乾燥時酌予灌水至濕潤。

六、菜豆豆莢被蟲蛀食，並自圓孔排出蟲糞，如何防治？（黃欽山：花蓮縣吉安鄉）

答：經檢查係受豆莢螟為害的情形，防治方法在菜豆開花時每 7~10 天選用 50%加保利可濕性粉劑稀釋 1,000 倍或 85%加保利可濕性粉劑稀釋 1,700 倍噴施，採收前七天停止施藥。

七、木瓜葉片穿孔，生育不良是何原因？如何預防。（曾振翹：花蓮縣吉安鄉）

答：實物診察係受葉蟬為害，防治方法建議參考採用 50%芬賜可濕性粉劑稀釋 2,000 倍，但應注意濃度避免藥害。