

## 農友信箱

### 陳朝欽 1993 花蓮區農業專訊 4:21

一、木瓜葉片變黃，植株矮化，不知何原因？如何防治？魏世清（花蓮縣吉安鄉）

答：經現場觀察係輪點病毒病，本病目前尚無藥劑治療，唯有預防方法減少發病，例如(一) 砍除病株減少田間病原；(二)種植輕病病毒接種苗，減少感染機會；(三)澈底防除蚜蟲減少傳播，1.防除藥劑可選用 90%納乃得可濕性粉劑 3,000 倍液，2.種植畦面鋪設反光布，3.株間種植玉米，避免蚜蟲直接傳染病原。

二、葡萄柚嫩葉部、枝條發生淡褐色斑點，遍佈全葉後使葉片脫落不知何原因？如何防治？李慶其（富里鄉）

答：經檢視結果係黑點病，防治方法可任選列一種藥劑施用，50%貝芬硫棍可濕性粉稀釋 800 倍、70%晴硫棍可濕性粉劑稀釋 1,000 倍，80%鋅錳乃浦可濕性粉劑稀釋 500 倍，33% 鋅錳乃浦水懸粉劑稀釋 500 倍。

三、辣椒果實病斑是何病？如何防治？宜蘭縣農會（宜蘭市）

答：經檢視係炭疽病，防治方法，應注意田間衛生，保持通風良好，藥劑以 22.7%晴硫棍水懸劑稀釋 700 倍，每十天施用一次，施藥時加展著劑可增強防治效果，該病原可經種子傳播，採種時應選無病果實種子，在育苗前種子應予消毒處理。

四、木瓜葉片布白色絲狀物後乾枯落葉，不知何原因，應如何防治？李盛雄（花蓮縣吉安鄉）

答：經現場觀察係白粉病，防治藥劑可施用 10.5%平克座乳劑等推廣藥劑，施藥時加展著劑可增強藥效。

五、洋香瓜葉片佈滿白色粉狀物，感染後期葉片枯乾後落葉不知何原因？如何防治？馬鴻業（花蓮市）

答：經檢查結果係白粉病，防治藥劑可任選下列一種施用，(1)50%普得松可濕性粉劑稀釋 2,000 倍；(2)21.2%依滅列乳劑稀釋 2,000 倍；(3)11.76%芬瑞莫乳劑 10,000 倍。

六、芥菜葉片枯萎是何症狀？如何防治？黃去麟（新秀地區農會）

答：經實體鏡檢係受葉潛蠅為害，建議參考施用 75%賽滅淨可濕性粉劑稀釋 5,000 倍，每 7 ~10 天用藥一次，應注意安全採收期。

七、芥菜葉上佈滿蟲體，葉片捲縮，生育不良如何防治？黃欽當（花蓮縣吉安鄉）

答：經診察係受偽菜蚜為害，建議選用下列一種藥劑 5.7%賽扶寧乳劑稀釋 2,000 倍，25%溴磷松乳劑乳劑稀釋 1,000 倍，20%免扶克乳劑乳劑 500 倍每七天施藥一次，採收前 21 天停止用藥。