

農友信箱

陳朝欽 1993 花蓮區農業專訊 3:23

一、番茄植株生長畸型（頂芽、葉簇生）是何原因？（謝水：花蓮縣吉安鄉）

答：經診斷係因栽種前園地噴施 41%嘉磷賽引起之藥害症狀。建議應於施藥後 30 天方可整地種植避免藥害。

二、麻竹施用雞糞後發生很多蟻蝽應如何防治？李樹幹流膠如何預防？（鄒運保：花蓮縣玉里鎮）

答：問題 1 .

建議選用 5%亞芬松粒劑或 5%繁福松粒劑每公頃施用 60 公斤，先行鬆土後均勻施放根際部再行覆土，應注意安全採收期。

問題 2 .

經診斷係李樹幹受流膠病感染後引起的流膠現象，防治方法(1).適度剪枝，(2).切除患部後以 80%益穗可濕性粉劑一份加石灰 20 份加水調成糊狀塗抹於切除部，俟癒合後木質部塗柏油。

三、柳橙生育不良，植株枯死是何原因？枇杷心葉部褐變，如何防治？（陳任璽：花蓮縣壽豐鄉）

答：柳橙受星天牛為害枯萎死亡，建議(1).於初春在樹幹距地面一公尺高度塗佈石灰乳或包紮塑膠布（網）以防成蟲產卵。(2).在 4~8 月間用 40.64%加保扶水懸粉 100 倍噴施離地 45 公分之樹幹基部，每個月施用一次，施用時應注意安全，並於採收前 10 天停止施藥。枇杷心部褐變經診斷係受灰斑病為害。防治方法每畝以 25%剋稻熱 500 倍或 75%四氯異苯晴可濕性粉 600 倍或 25%剋熱 500 倍施藥一次。

四、文旦落果枯枝，不知是何原因？如何防治？（吳儀雄：花蓮縣吉安鄉）

答：經現場觀察係受赤衣病嚴重為害所造成。

防治方法：注意栽植環境，儘量使用園區通風，目前尚無推薦藥劑，可先行剪除受害及過密枝條後參考枇杷赤衣病防治法，施用 50%貝芬銅 750 倍或 63%銅鋅錳乃浦可濕性粉劑 500 倍，在雨季應特別注意防治。

五、網室內斜紋夜盜蟲及栽種萵苣感染白粉病如何防治？（林景耀：花蓮市）

答：斜紋夜盜蟲防治建議(1).休耕期間浸水藉以淹死幼蟲、蛹等。(2).栽種期間利用性費洛蒙誘殺成蟲。

白粉病：參考用 50%免賴得可濕性粉劑 1,500 倍或 13.4%邁克尼乳劑 4,000 倍，每 10 天噴施一次，採收前三天停用。