

農友信箱

陳朝欽 1992 花蓮區農業專訊 1:23

一、文旦柚果實表皮（幼果期）受病蟲為害，果皮硬化成黑褐色斑點，應如何防治？（鍾文彥：花蓮縣瑞穗鄉）

答：1.經鑑定為角肩椿象為害。

2.防治方法：可選用 44%大滅松乳劑 1,000 倍，每公頃施用 2 公升，或 85%加保利可濕性粉劑 850 倍，每公頃 2.4 公升。於文旦幼果出現為害時開始施藥，以後每隔 10 天施藥一次共兩次。

二、竹葉片產生白斑，常有許多類似蚊蟲的蟲體停在葉背，應如何防治？（蔡燕兒：花蓮縣花蓮市）

答：經檢查結果係受竹盲椿象為害造成白斑，週年以 5~10 月發生密度最高，可選用 30%撲芬松乳劑 1,500 倍或 20%芬化利乳劑 2,000 倍，每 10~15 天施一次藥；或以 25%滅賜松乳劑原液塗抹於胸高之竹節一圈，每隔 14 天塗抹一次，嚴重發生時會伴隨鏽病發生，應同時注意鏽病之防治。

三、青蔥生長勢不良，不知是何原因？（廖芳仁：花蓮縣吉安鄉）

答：經現場觀察結果係根部受根蹣為害所致，目前尚無推薦防治方法。可採用預防措施（參考資料）：選用 25%新殺蹣乳劑稀釋 4,000 倍或 20%西脫蹣乳劑 2,000 倍，於種植前浸漬根部及莖部 5~30 分鐘。

四、檳榔新葉皺縮，頂梢畸形生長，應如何防治？（葉四正：花蓮縣花蓮市）

答：經鑑定為紅胸業蟲為害，建議施用：(1)50%安丹可濕性粉劑 1,000 倍加展著劑，每兩個月施藥一次，以高壓動力噴霧機噴注於心業處，在魚塢周圍避免施藥。採收前 10 天停止施藥。(2)40.8%陶斯松乳劑 1,000 倍施用方法同前，採收前 5 天停止用藥。

五、木瓜果實上圓型水浸狀斑點，是何病害？如何防治？（闕煥章：花蓮市）

答：經診斷病果係木瓜炭疽病。建議自開花期開始，每七天噴佈下列藥劑，並酌加展著劑：80%錳乃浦可濕性粉劑 400 倍或 58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑 500~600 倍，採收前七天停止使用。

六、山地栽培果樹（枇杷、梨）受鳥害，如何預防？（郭旺達：台中縣豐原鎮）

答：建議果園佈置天羅彩帶或佈置音爆驅鳥器。