

農友信箱

陳哲民

1.文旦柚象鼻蟲為害新梢，銹蟬為害果皮，赤衣病為害枝條，應如何防治？（劉富雄；花蓮縣吉安鄉永安村一段 120 號）

答：象鼻蟲可參考香蕉象鼻蟲防治方法，根頭附近 40 - 50 公分，撒施 3%加保扶粒劑，每株 40 - 50 公克。地上部噴施 40.64%加保扶水懸粉 800 倍液。銹蟬可選用 50%芬佈賜水懸粉 2,000 倍液或 50%佈嘉信乳劑 1,000 倍液或 42%克芬蹒水懸粉 3,000 倍液。赤衣病則參考枇杷赤衣病防治法，噴施 50%貝芬同混合可濕性粉劑 750 倍液防治之。

2.葡萄柚葉片有粗糙褐色斑點，是何原因？如何防治？（謝永根；花蓮縣吉安鄉福興村 4 鄰 203 號）

答：經鑑定係柑桔潰瘍病。可任選下列藥劑防治①65%鎳乃浦可濕性粉劑 400 倍液②4 - 4 式波爾多液 56%氧化亞銅可濕性粉劑 600 倍③81.3%嘉賜銅可濕性粉劑 1,000 倍液。每年 4 8 月間每隔 15 天施藥一次，風雨之後酌予增施一次。高溫時易引起輕微藥害，宜注意之。

3.甜椒新葉捲縮，生育不良，是何原因？如何防治？（錢有田；花蓮縣秀林鄉天祥村西寶 1 號）

答：經鏡檢為甜椒細蹒為害造成。可輪流施用下列藥劑防治細蹒：①50%得氯蹒可濕性粉劑 1,500 倍液②30%可濕性硫磺粉 400 倍③25%新殺蹒乳劑 500 倍④25%亞環錫可濕性粉劑 1,500 倍。

4.文旦柚地際部流膠，如何防治？並請送文旦栽培手冊。（范玉蘭；花蓮縣瑞穗鄉瑞美村 177 號）

答：地際部流膠係褐腐病為害所致。以利刃切除患部後，以生石灰 20 份，80%益穗可濕性粉劑 1 份，加水調成糊漿，塗抹於切除部位。寄送文旦栽培手冊一本。

5.番石榴葉背，果實上密布蟲體，並有煤煙狀物，是何蟲為害，如何防治？（羅萬全；花蓮縣富里鄉富南村 7 鄰 86 號）

答：經察係受粉介殼蟲為害，並誘發煤病。建議採用 25%谷速松可濕性粉劑 800 倍液或 50%普硫松乳劑 2,000 倍液於初發生時，每隔 10 天噴一次，連續 2 - 3 次。

6.文旦柚地面幹部蟲孔排出木屑及蟲糞，如何防除？（黃玉煌；花蓮縣吉安鄉慈雲山觀光農場）

答：經檢查係受星天牛為害。成蟲一般於每年 4 - 7 月出現。可於成蟲出現前，在樹幹自地面至一公尺高度處塗布石灰乳或包紮塑膠布或網，以防產卵。施用 40.64%加保扶水懸粉劑 100 倍液於離地面 45 公分之樹幹基部。

7.紅甘蔗近梢部莖，環狀裂痕，脆而易斷，葉片捲皺，是何原因？如何防治？（黃棟發；花蓮縣花蓮市國聯里國民 8 街 59 號）

答：經診斷係梢腐病，每年於雨季後發生較多。可參考施用 50% 免賴得可濕性劑 1500 倍液防治之。