

## 專為農民解答的專欄信箱

### 高安全

(一) 東方果實蠅的防治方法？(花蓮縣鳳林鎮范阿信)

答：經現場勘查結果係東方果實蠅為害。採用下列方法防治：(1).懸掛沾有「含毒甲基丁香油誘殺器加以誘殺。(2).25%馬拉松可濕性粉劑 100 倍或 80%三氯松可濕性粉劑，600 倍混合蛋白質 100 倍，每 7 天施藥一次。

(二) 西瓜蔓割病，甜椒疫病，炭疽病防治方法？(花蓮縣鳳林鎮陳金茂)

答：(1).西瓜蔓割病：建議整地前使用 SH 混合物，每公頃 1,500 公斤，全面施用，攪拌均勻。或利用扁蒲嫁接，可有效防治。

(2).甜椒疫病用使用 25%依得利乳劑，2,500 倍，每 7 10 天噴一次，連續 3 次。

(3).甜椒炭疽病使用 22.7%的晴硫琨水懸粉劑 700 倍。每 10 天噴一次共三次。

(三) 甘藍黑斑病如何施藥防治？(花蓮縣壽豐鄉平和里 12 鄰 42 號李佩山)

答：建議採用 75%四氯異苯晴可濕性粉劑 700 倍，自發病初期開始噴藥，每隔 10 天噴一次連續 3 4 次。

(四) 胡瓜病害及甜椒病害防除法？(花蓮縣吉安鄉黃俊卿)

答：(1).胡瓜炭疽病，可噴 70%四氯保淨混合可濕性粉劑 500 倍稀釋液，每公頃每次用藥量 2 3 公斤。發病初期開始施藥，每 7 天施藥一次連續三次。

(2).胡瓜露菌病噴 75%四氯異苯晴可濕性粉劑 500 倍稀釋液，每公頃每次用藥量 2 3 公斤，發病初期開始施藥，每隔七天施藥一次，連續 3 次。

(3).甜椒疫病採用 70%普拔克溶液 400 倍，每公頃 10 公升。播種當天噴藥一次，若發病時每 10 20 天灌一次(以澆水器均勻淋灌於苗床土壤)。

(五) 柑桔潛葉蛾及其防治方法？(花蓮縣鳳林鎮沈添財)

答：下列藥劑任選一種防治：(1).50%馬拉松乳劑(800 倍)。 (2).44%大滅松乳劑(1,000 倍)。 (3).90%納乃得可濕性粉劑(3,000 倍)。 (4).50%歐滅松溶液(1,000 倍)。 (5).24%納乃得溶液(750 倍)。

(六) 我在福興村種植現已四年生麻竹及綠竹計五分地，以往生長發筍正常，自去年起零星發生竹筍節間有黃色或淡紅色條斑。剝開條斑部份，可見到變色的維管束。梢部萎凋，生長緩慢稍後腐敗，整株枯死是何病因？如何防治？(花蓮縣吉安鄉慶豐村 74-5 號巫坤珍)

答：經前往田間實物診察為「細菌性萎凋病」。其防治方法，依照植物保護手冊推行方法指導防治。

(1).加厚竹叢覆土，避免病原菌侵入。

(2).自產竹筍期前一個月，開始至收穫完畢為止。每隔半個月施藥一次。預留母株三株，每平方公尺面積，將土壤拌合 80%四氯丹可濕性粉劑 10 公克，均勻撒佈於竹叢週圍。