

颱風豪雨後 農作物管理因應措施

89/07/25 花蓮區農情月刊 148

有鑑於啟德輕度颱風過境，花蓮地區受到環流影響連續降雨，累積雨量達 163.5 公厘形成高濕之環境，影響各類作物之生育與誘引病蟲害發生，為減少損害，本場謹就下列主要作物管理上之因應措施，提供農友參考：

■水稻：一期作成熟收割期，二期作育苗期，早植稻插秧期

- 1.注意田區排水。
- 2.成熟期水稻應即收割，以防倒伏之稻株穗上發芽。
- 3.綠化場秧苗或已插秧者，適時注意預防白葉枯病施藥（如噴施 10%克枯爛可濕性粉劑 1,000 倍液）。

■玉米：成熟期，晚植者結穗期或生長期

- 1.雨後排除園區積水，防止因田土過濕倒伏。
- 2.雨後斜倒的玉米株應扶正，晚植者則予酌施追肥並培土。
- 3.雨後應注意煤紋病、葉斑病之施藥預防（如噴施 80%錳乃浦可濕性粉劑 400 倍）。

■甘藷：生育期或成熟收穫期

- 1.儘速排除田間積水。
- 2.近收穫期者，適時提早收穫以免因受水淤淹而腐爛。
- 3.生育初、中期者，於颱風過後隨即施用追肥並培土。
- 4.噴施預防縮芽病、瘡痂病藥劑，以促恢復生長。

■蔬菜瓜果：生長、結果、採收期

- 1.儘速排除田間積水。並實施清園，撿拾廢、落果，避免成為病煤傳播源。
- 2.雨後容易發生病蟲害，應即時參照植物保護手冊選擇推薦藥劑，加強防治軟腐病、炭疽病、疫病、銹病，並確切遵守安全採收期。
- 3.流失、埋沒菜園及時復耕，重新播種。
- 4.蔬菜瓜果園區實施清園並酌補施肥，每 0.1 公頃施用尿素 20 公斤（硫酸銨 44 公斤）、氯化鉀 4 公斤，以促進發育。

■文旦、柑桔：結果期

- 1.颱風災後即排除田區積水。並實施清園，撿拾廢、落果，避免成為病媒傳播源。
- 2.倒伏之植株儘速扶起重立支柱，折損之枝條適當之修剪。樹勢穩定後酌量施肥。
- 3.加強預防潰瘍病、瘡痂病防治之施藥工作。

■木瓜：開花結果期

- 1.雨後即排除田區積水。並實施清園，撿拾廢、落果，避免成為病煤傳播源。
- 2.傾斜之植株儘速以支柱支撐，勿使果實接觸地面。
- 3.果實噴施疫病防治藥劑後以廢紙、雜草覆蓋，防止日燒。

4.施藥後遵守安全採收期。