休耕田區綠肥田菁注意防範蟲害　多雨高濕，蔬果嚴防病害

87/10/25 花蓮區農情資訊 119

花蓮地區二期休耕水田種植綠肥田菁恢復地力，但田菁生長期間易發生斜紋夜盜蟲危害，此蟲為雜食性也容易為害鄰近作物，田區若發生蟲害時可選擇下列藥劑之一實施防治。

藥劑名稱	公頃施用量	稀釋倍數
25%汰芬隆水懸劑	1.0-1.5 公升	750
30%佈芬賽滅寧乳劑	0.8-1.0 公升	1,000
2.8%畢芬寧乳劑	0.5-1.0 公升	2,000
2.8%賽洛寧乳劑	0.5-1.0 公升	2,000
75%硫敵克可濕性粉劑	0.3-0.5 公斤	3,000
10%百滅寧乳劑	0.3-0.5 公升	3,000

受颱風環流影響，天候多雨、濕度大，蔬果易發生病害，各鄉鎮蔬菜瓜果園區，應注意排水管理及施藥後遵守安全採收期，提供下列蔬果病害防治法歡迎農友參考採用。

1.蔬菜露菌病：發病初期以 74.1%銅滅達樂可濕性粉劑 600 倍或 48%松香脂銅粒劑 1,000 倍噴施，每 7-10 天一次。

2.胡瓜炭疽病：發病初期以 70%四氯保淨可濕性粉劑 500 倍噴施，每 7 天一次。

3.甜椒疫病：發病初期以 83%氫氧銅可濕性粉劑 400 倍噴施，每 7 天一次。

4.韭菜銹病：雨後即以 5%菲克利水懸劑 1,500 倍噴施，每 7-10 天一次。